

Czym jest enterokliza MR?

Polega na poprowadzeniu cienkiej rurki przez nos lub jamę ustną do żołądka lub przez ten narząd. Następnie przed wykonaniem zdjęcia bezpośrednio do jelita cienkiego wstrzykujemy Klean-Prep lub jego zamiennik. Robimy to w osobnym pomieszczeniu pod opieką rentgenowską. Prowadzenie rurki może być trochę nieprzyjemne, ale pacjent nie będzie musiał pić żadnej substancji, a zdjęcie może być lepszej jakości.

Gdzie przeprowadza się zabieg?

W pracowni radiologicznej lub obrazowania z użyciem aparatu do rezonansu magnetycznego.

Kiedy mogę omówić jego wynik?

Wynik można omówić z lekarzem kierującym na zabieg lub radiologiem/technikiem-elektrodiagnostą przed jego przeprowadzeniem.

Jeden dzień przed zabiegiem

Należy stosować wyłącznie lekką dietę i należy nie jeść owoców lub warzyw. Konieczne jest także sprawdzenie listy produktów, które wolno spożywać i których należy unikać.

W dzień zabiegu

Jeśli wizyta ma odbyć się rano, przed północą poprzedniego dnia nie należy niczego jeść. Można jednak pić wodę.

Jeśli wizyta odbywa się popołudniem, należy zjeść lekkie śniadanie i nie jeść już niczego potem. Można jednak pić wodę.

Pacjentowi może zostać wstrzyknięty środek zwiotczający mięśnie (Buscopan), który zapobiegnie skurczom jelit. Buscopan może spowodować czasowe zaburzenie widzenia. Po zabiegu utrzymują się one jedynie krótko, ale odradzamy samodzielną jazdę samochodem. Pacjent w miarę możliwości powinien umówić się z kimś, kto go odbierze.

Cukrzyca

Pacjenci cierpiący na cukrzycę powinni kontynuować przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami.

Przed rezonansem magnetycznym

Aparat do rezonansu magnetycznego wykorzystuje silne pole magnetyczne. Ze względu na własne bezpieczeństwo i w celu uniknięcia wyczerpującej podróży konieczne jest wypełnienie załączonego kwestionariusza kontrolnego dotyczącego bezpieczeństwa podczas rezonansu magnetycznego (MRI Safety Checklist Questionnaire). Prosimy o zabranie ze sobą wypełnionego kwestionariusza. Pacjenci mający jakieś pytania na temat tego, czy mogą się poddać rezonansowi magnetycznemu, powinni skontaktować się z oddziałem (na ostatniej stronie znajdują się dane do kontaktu).

Rezonansu magnetycznego nie można przeprowadzić u osób z:

- rozrusznikiem serca;
- implantem ślimakowym (dousznym);
- klipsami metalowymi na tętniakach mózgu;
- odłamkami metalu w oku;
- pewnymi metalowymi implantami.

Jak wygląda zabieg enteroklizy MR?

Pacjent zostanie zabrany do pracowni rentgenowskiej i poproszony o położenie się na plecach na stole do badań. Do żołądka przez nos lub usta pacjenta poprowadzimy cienką rurkę. Z wykorzystaniem zdjęć rentgenowskich prowadzimy rurkę przez żołądek do jelita cienkiego. Następnie przyklejamy rurkę do nosa, aby pozostała nieruchoma.

Pacjent zostanie następnie zabrany do pracowni rezonansu magnetycznego i poproszony o położenie się na żołądka na stole do badań. Technicy-elektrokardiolodzy wpuszczą płyn do rurki, który dostanie się bezpośrednio do jelita cienkiego i zrobią zdjęcia, kiedy napełni się ono płynem.

Pacjentowi może zostać wstrzyknięty środek zwiotczający mięśnie (Buscopan), który zapobiegnie skurczom jelit.

Kiedy jelito cienkie odpowiednio napełni się, technik-elektrokardiolog zaprzestanie wstrzykiwania płynu i wykona zdjęcia.

Jak długo potrwa zabieg?

Robienie zdjęć może potrwać od 30 minut do 2 godzin.

Co dzieje się po zabiegu enteroklizy MR?

Pacjent zostanie poproszony o pozostanie w pracowni przez 15–20 minut przed wyjściem do domu. Klean-Prep może spowodować biegunkę, zatem konieczna może okazać się wizyta w toalecie. Warto też o tym pamiętać przy okazji powrotu do domu.

Czy z zabiegiem wiąże się jakieś ryzyko?

Enteroklizę MR uważa się za bardzo bezpieczne badanie.

Problemy pojawiają się bardzo rzadko. Jeśli wystąpią, są one podobne do tych, które pojawiają się przy badaniach jelita innymi sposobami. Są to: dyskomfort w jamie brzusznej; uczucie omdlenia, reakcja na wstrzyknięty kontrast (barwnik), biegunka po przyjęciu Klean-Prep.

Badanie to zostało zalecone przez lekarza pacjenta, ponieważ uważa on, że korzyści przewyższają ryzyko wynikające z jego nieprzeprowadzenia. Nawet w takiej sytuacji nie możemy zagwarantować, że podczas badania zostaną wykryte wszystkie nieprawidłowości w jelicie.

Środki ostrożności

- Wszystkie leki powinno się nadal przyjmować zgodnie z zaleceniem.
- W przypadku ciąży lub problemów po przyjęciu Klean-Prep, które wystąpiły w przeszłości, należy skontaktować się po poradę pod numer telefonu na piśmie z potwierdzeniem wizyty.

Produkty, które wolno spożywać:

- miękkie, chude mięso, drób, szynka, wątroba, nerki, teksturowane białko roślinne;
- jogurt o smaku owocowym lub zestalony;
- ziemniaki obrane, gotowane, tłuczone, pieczone;
- marchew, rzepa, brukiew, kalafior (bez łodyg);

- klarowna lub przecedzona zupa;
- puszkowane miękkie owoce w soku (bez pestek);
- biały chleb, mąka, ryż lub makaron;
- krakersy (water biscuits i cream crackers), herbatniki Rich Tea;
- babeczki (scone) bez dodatków (bez owoców);
- miód, syrop, lody;
- herbata, kawa, cukier, słodziki, ale koniecznie bez mleka do herbaty lub kawy;
- sok pomidorowy, klarowny sok owocowy, zagęszczony sok owocowy (squash);
- woda i napoje gazowane.

Produkty, których należy unikać:

- twarde mięso, burgery z wołowiną, kiełbasa;
- kiełbasa zapiekana (sausage rolls), mięso zapiekane w cieście (pies), paszteciki (pasties), słodkie pieczywo;
- mleko, masło, ser, margaryna, oleje;
- jogurty z całymi owocami lub musli;
- ziemniaki w mundurkach — należy je obrać;
- wszystkie pozostałe owoce, warzywa i sałata;
- gęsta zupa, fasolka z puszki;
- chleb razowy lub mąka razowa, makaron razowy, brązowy ryż;
- z wysoką zawartością błonnika: pieczywo chrupkie, herbatniki naturalne typu „digestives”, ciastka Hobnobs;
- ciasta z owocami, orzechami, kokosami;
- orzechy i suszone owoce;
- dżem lub marmolada ze skórką lub pestkami owoców;
- płatki, owsianka, musli, płatki Bran z wysoką zawartością błonnika.

Kiedy poznam wyniki?

Wyniki prześlemy konsultantowi szpitalnemu lub lekarzowi rodzinnemu, który zlecił nam wykonanie zabiegu.

Uwaga: O pacjentach, którzy nie stawią się na badanie, poinformujemy ich konsultanta szpitalnego lub lekarza rodzinnego. Usuniemy ich także z naszej listy oczekujących na zabieg.

O jakichkolwiek powodach do niepokoju dotyczących zabiegu należy poinformować technika-elektrodiagnosty.

Inne pytania?

Można je zadawać pracownikom zespołu w pracowni obrazowania (Imaging Department).

Umówiona wizyta

Prosimy:

- o niezabieranie ze sobą żadnych cennych przedmiotów;
- o telefon, jeśli będzie potrzebna porada.

Pacjenci, którzy nie mogą zjawić się na umówioną wizytę, powinni możliwie najszybciej powiadomić nas o tym, aby inni pacjenci mogli skorzystać z tego terminu.

Numer telefonu do centrum kontaktu

0141 347 8379

www.nhsgg.org.uk

Data wprowadzenia
zmian: lipiec 2018 r.



MI • 290676 Polish