
ALBANIAN

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Informacione rreth

Tuberkulozit Latent

(Shqip)



Çfarë është Tuberkuloza Latente (TB)?

TB latent është kur bakteret e TB-së janë në trupin tënd, por ti nuk ke TB aktive.

- Edhe pse mikrobet e TB-së janë brenda trupit tuaj, s istemi juaj imunitar i mban nën kontroll.
- Nuk do të keni asnjë simptomë dhe nuk do të ndiheni keq.
- Nuk mund t'i transmetoni mikrobet e TB-së askujt tjetër.

TB-ja latente mund të quhet edhe infeksion TB, TB e fjetur ose TB joaktive.

Si e diagnostikon TB-në latent?

Ka teste të ndryshme që mund të përfshijnë një test lëkure për tuberkuloz dhe/ose një test gjaku për të konfirmuar TB latente.

Pse të trajtojmë TB-në latent?

- TB-ja latente duhet trajtuar për të parandaluar zhvillimin e TB-së aktive në të ardhmen.
- Zakonisht sistemi imunitar i trupit shkatërron mikrobet sapo ato thithen. Megjithatë, nëse sistemi imunitar i trupit dobësohet, mund të mos arrijë t'i mbajë mikrobet e TB-së nën kontroll. Kjo lejon që mikrobet e TB-së të bëhen aktive.

Cili është trajtimi?

Trajtimi për TB-në latente zakonisht janë dy antibiotikë të dhënë së bashku në një tabletë çdo ditë për 3 muaj.

Bakteret e TB-së shkatërrohen shumë ngadalë, kështu që është shumë e rëndësishme të përfundosh të gjithë kursin e trajtimit me antibiotikë. Mos përfundimi i kursit mund të të rrezikojë të zhvillosh TB aktive në të ardhmen.

Do të duhet një analizë gjaku për të kontrolluar që mëlçia juaj po funksionon normal para dhe gjatë trajtimit.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Pyridoxine
Vitamin B6

A ka efekte anësore?

Ndërsa po merrni antibiotikët, mund të vini re që urina juaj; lëvizjet e zorrëve; lotët ose djersa mund të kenë një ngjyrë të kuqe ose portokalli. Kjo është një efekt anësor pa rrezik.
Lentet e kontaktit të buta mund të ndryshojnë ngjyrën.

Antibiotikët mund të bëjnë që pilula kontraceptive dhe metoda të tjera të kontracepsionit të jenë më pak efektive. Kjo do të thotë që gjithashtu duhet të përdorni një metodë të besueshme pengese, si kondomet.
Ju lutem diskutoni këtë me klinikën e planifikimit familjar, mjekun ose farmacistin tuaj.

Tregoji mjekut tënd, nëse përjeton:

- Të përziera ose të vjella
- Ikter (verdhim i pjesës së bardhë të syrit ose lëkurës)
- Skuqje ose kruarje që vazhdon
- Ethe
- Mpirje e gishta dhe gishta e këmbëve

Mbaje mend

- Duhet të merrni antibiotikët çdo ditë, 30 minuta para mëngjesit
- Mos humbisni asnjë doze
- Shmangni alkoolin
- Përpiquni të merrni pjesë në të gjitha vizitat në klinikë

Shmang

Nuk duhet të përdorni shtrat dielli gjatë trajtimit tuaj. Ju lutemi përdorni krem dielli me faktor të lartë kur lëkura juaj është e ekspozuar ndaj rrezeve të forta të diellit. (Disa tableta kundër tuberkulozit mund ta bëjnë lëkurën tuaj më të ndjeshme ndaj rrezeve të diellit.)

Informacione të Mëtejshme:

Nëse keni nevojë për më shumë informacion ose këshilla, kontaktoni infermierin tuaj lokal për TB-në.:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow and Clyde East and North
☎ 0141 201 3900
Hënë - E Enjte 9:00 - 18:00 (Premte 16:30)

Gartnavel General Hospital

Glasgow and Clyde West
☎ 0141 232 2161
Hëne - Mërkure 8:00 - 16:00

Queen Elizabeth University Hospital

Glasgow and Clyde South
☎ 0141 451 5862
Hëne - Enjte 8:00 - 16:00

New Victoria Hospital

Glasgow and Clyde South West
☎ 0141 345 8846
Marte - Premte 9am - 4pm