
NHS
Greater Glasgow and Clyde

ARABIC

معلومات حول

السُّل الكامن

(العربية)



مرض السل الكامن

- السُّل نشط وينمو في الجسم
- يجعل الشخص يشعر بالتوعك ويعاني من الأعراض
- يمكن أن ينتشر من شخص لآخر
- يمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يعالج

السل الكامن

- يعيش السل ولكنه لا ينمو في الجسم
- لا يجعل الشخص يشعر بتوعك أو يعاني من أعراض
- لا يمكن أن ينتشر من شخص لآخر
- يمكن أن يتطور إلى مرض السُّل

ما هو السُّل الكامن (TB)؟

السُّل الكامن هو عندما تكون جراثيم السُّل موجودة في جسمك ولكنك لا تعاني من السُّل النشط.

- على الرغم من أن جراثيم السُّل موجودة داخل جسمك، إلا أن جهازك المناعي يبقيها تحت السيطرة.
- لن تظهر عليك أي أعراض أو تشعر بتوعك.
- لا يمكنك نقل جراثيم السُّل إلى أي شخص آخر.

يمكن أيضًا أن يسمى السُّل الكامن عدوى السُّل أو السُّل الخامل أو السُّل غير النشط.

كيف تشخص السُّل الكامن؟

هناك العديد من الاختبارات التي قد تشمل اختبار السُّل الجلدي و، أو اختبار الدم لتأكيد السُّل الكامن.

لماذا نعالج السُّل الكامن؟

- يجب علاج السُّل الكامن لمنع إصابتك بالسُّل النشط في المستقبل.
- عادة ما يدمر الجهاز المناعي للجسم الجراثيم بمجرد استنشاقها. ومع ذلك، إذا ضعف الجهاز المناعي للجسم، فقد لا يتمكن من السيطرة على جراثيم السُّل. وهذا يسمح لجراثيم السُّل بأن تصبح نشطة.

ما هو العلاج؟

علاج السُّل الكامن عادة ما يكون اثنين من المضادات الحيوية تعطى معا في قرص واحد كل يوم لمدة ٣ أشهر.

يتم قتل جراثيم السُّل ببطء شديد، لذلك من المهم جدًا إكمال الدورة الكاملة للعلاج بالمضادات الحيوية. قد يؤدي عدم إكمال الدورة إلى تعريضك لخطر الإصابة بالسُّل النشط في المستقبل.

ستحتاج إلى فحص دم للتحقق من أن الكبد يعمل بشكل طبيعي قبل وأثناء العلاج.



ريفينا Rifinah 150/100 ملغ



ريفينا Rifinah 300/150 ملغ



بيريدوكسين Pyridoxine
فيتامين ب ٦

هل هناك أثار جانبية؟

أثناء تناولك للمضادات الحيوية، قد تلاحظ أن لون البول أو الأمعاء أو الدموع أو العرق قد يكون أحمر أو برتقالي. هذا تأثير جانبي غير ضار.
قد يتغير لون العدسات اللاصقة الطرية.

يمكن للمضادات الحيوية أن تجعل "حبوب" منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل أقل فعالية. وهذا يعني أنك ستحتاج أيضًا إلى استخدام وسيلة وقاية موثوقة مثل الواقي الذكري. يرجى مناقشة هذا الأمر مع عيادة تنظيم الأسرة أو الطبيب أو الصيدلي.

يرجى إخبار طبيبك العام، إذا عانيت من:

- الغثيان أو القيء
- اليرقان (اصفرار الجزء الأبيض من العين أو الجلد)
- الطفح الجلدي أو الحكة المستمرة
- حُمَّى (حرارة أو سخونة)
- وخز في أصابع اليدين أو القدمين

تذكر

- يجب أن تأخذ المضادات الحيوية كل يوم، ٣٠ دقيقة قبل الإفطار
- لا تفوت جرعة
- تجنب الكحول
- حاول حضور جميع مواعيد العيادة

تجنب

يجب عدم استخدام أسرّة التشمس أثناء علاجك. يرجى استخدام واقي شمسي ذو عامل أعلى عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس القوية. (يمكن لبعض أقراص مكافحة السُّل أن تجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس).

معلومات إضافية:

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة، فاتصل بممرضة السُّل المحلية:

مستوصف غلاسكو الملكي Glasgow Royal Infirmary

غلاسكو وكلايد شرق و شمال Glasgow and Clyde East and North

☎ ٠١٤١ ٢٠١ ٣٩٠٠

الاثنين - الخميس ٩ صباحًا - ٦ مساءً (الجمعة ٤:٣٠ مساءً)

مستشفى غارتنافيل العام Gartnavel General Hospital

غلاسكو و كلايد غرب Glasgow and Clyde West

☎ ٠١٤١ ٢٣٢ ٢١٦١

الاثنين - الأربعاء ٨ صباحًا - ٤ مساءً

مستشفى جامعة الملكة إليزابيث Queen Elizabeth University Hospital

غلاسكو وكلايد جنوب Glasgow and Clyde South

☎ ٠١٤١ ٤٥١ ٥٨٦٢

الاثنين - الخميس ٨ صباحًا - ٤ مساءً

مستشفى نيو فيكتوريا New Victoria Hospital

غلاسكو و كلايد غرب Glasgow and Clyde West

☎ ٠١٤١ ٣٤٥ ٨٨٤٦

الثلاثاء - الجمعة ٩ صباحًا - ٤ مساءً