NHS
Greater Glasgow and Clyde

FARSI

اطلاعات درباره
سل نهفته
(FARSI)



بیماری سل فعال

- باکتری سل در بدن فعال است و رشد می‌کند
- باعث می‌شود فرد احساس بیماری کند و علائم بیماری داشته باشد
- می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود
- در صورت درمان نشدن، می‌تواند باعث مرگ شود

سل نهفته

- باکتری سل در بدن زنده می‌ماند، اما رشد نمی‌کند
- باعث نمی‌شود فرد احساس بیماری کند یا علائمی داشته باشد
- از فردی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود.
- ممکن است به بیماری سل فعال تبدیل شود

سل(TB) نهفته چیست؟

سل نهفته زمانی است که باکتری‌های سل در بدن شما وجود دارند، اما شما به بیماری سل فعال مبتلا نیستید.

- اگرچه باکتری‌های سل در بدن شما وجود دارند، سیستم ایمنی بدن آن‌ها را تحت کنترل نگه می‌دارد.
- هیچ‌گونه علائمی نخواهید داشت و احساس بیماری نخواهید کرد.
- نمی‌توانید باکتری سل را به افراد دیگر منتقل کنید.

سل نهفته ممکن است "عفونت سل"، "سل غیرفعال" یا "سل خفته" نیز نامیده شود.

سل نهفته چگونه تشخیص داده می‌شود؟

برای تشخیص سل نهفته آزمایش‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است شامل آزمایش پوستی توبرکولین و/یا آزمایش خون باشد.

چرا سل نهفته باید درمان شود؟

- سل نهفته باید درمان شود تا از ابتلای شما به بیماری سل فعال در آینده جلوگیری شود.
- معمولاً سیستم ایمنی بدن پس از ورود باکتری‌های سل از طریق تنفس، آن‌ها را از بین می‌برد. با این حال، اگر سیستم ایمنی بدن ضعیف شود، ممکن است نتواند باکتری‌های سل را تحت کنترل نگه دارد. در این صورت، باکتری‌های سل می‌توانند فعال شوند.

درمان چیست؟

درمان سل نهفته معمولاً شامل ۲ نوع آنتی‌بیوتیک است که به‌صورت ترکیبی در یک قرص، هر روز به مدت ۳ ماه مصرف می‌شوند.

باکتری‌های سل بسیار آهسته از بین می‌روند؛ بنابراین بسیار مهم است که دوره کامل درمان با آنتی‌بیوتیک را به پایان برسانید. کامل نکردن دوره درمان می‌تواند شما را در معرض خطر ابتلا به سل فعال در آینده قرار دهد.

پیش از شروع درمان و در طول دوره درمان، لازم است آزمایش خون انجام دهید تا بررسی شود که کبد شما به‌طور طبیعی کار می‌کند.



ریفاینا ۱۰۰/۱۵۰ میلی‌گرم



ریفاینا ۱۵۰/۳۰۰ میلی‌گرم



پیریدوکسین (Pyridoxine)
ویتامین ب ۶

آیا عوارض جانبی وجود دارد؟

در طول مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، ممکن است متوجه شوید که ادرار، مدفوع، اشک یا عرق شما به رنگ قرمز یا نارنجی درمی‌آید. این یک عارضه جانبی بی‌ضرر است.
لنزهای تماسی نرم ممکن است تغییر رنگ دهند.

آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند اثربخشی قرص‌های پیشگیری از بارداری و سایر روش‌های پیشگیری از بارداری را کاهش دهند. بنابراین، لازم است همزمان از یک روش مطمئن بازدارنده، مانند کاندوم، نیز استفاده کنید.
لطفاً در این مورد با کلینیک تنظیم خانواده، پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

اگر هر یک از موارد زیر را تجربه کردید، لطفاً به پزشک عمومی (GP) خود اطلاع دهید:

- تهوع یا استفراغ
- یرقان (زرد شدن سفیدی چشم یا پوست)
- بثورات پوستی یا خارش مداوم
- تب
- گزگز انگشتان دست و پا

به یاد داشته باشید

- باید آنتی‌بیوتیک‌ها را هر روز، ۳۰ دقیقه قبل از صبحانه مصرف کنید
- هیچ نوبتی از مصرف دارو را فراموش نکنید
- از مصرف الکل خودداری کنید
- سعی کنید در تمام نوبت‌های درمانگاه حضور پیدا کنید

مواردی که باید از آن‌ها اجتناب کنید

در طول دوره درمان نباید از دستگاه‌های برنزه‌کننده استفاده کنید. هنگامی که پوست شما در معرض نور شدید خورشید قرار می‌گیرد، لطفاً از کرم ضدآفتاب با ضریب محافظتی بالا استفاده کنید. برخی از قرص‌های ضد سل می‌توانند پوست شما را نسبت به اشعه‌های خورشید حساس‌تر کنند

اطلاعات بیشتر:

اگر به اطلاعات یا راهنمایی بیشتری نیاز دارید، با پرستار سل در منطقه خود تماس بگیرید:

بیمارستان سلطنتی گلاسگو (Glasgow Royal Infirmary)

مناطق شرق و شمال گلاسگو و کلاید

۰۱۴۱ ۲۰۱ ۳۹۰۰ ☎

دوشنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر جمعه تا ساعت ۴:۳۰ عصر

بیمارستان عمومی گارت‌نِیول (Gartnavel General Hospital)

منطقه غرب گلاسگو و کلاید

۰۱۴۱ ۲۳۲ ۲۱۶۱ ☎

دوشنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر

بیمارستان دانشگاهی ملکه الیزابت (Queen Elizabeth University Hospital)

منطقه جنوب گلاسگو و کلاید

۰۱۴۱ ۴۵۱ ۵۸۶۲ ☎

دوشنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر

بیمارستان نیو ویکتوریا (New Victoria Hospital)

منطقه جنوب غربی گلاسگو و کلاید

۰۱۴۱ ۳۴۵ ۸۸۴۶ ☎

سه‌شنبه تا جمعه، ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر