
FRENCH

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Informations sur

la tuberculose latente

(Français)



Qu'est-ce que la tuberculose latente?

On désigne la tuberculose latente lorsqu'il y a des bacilles de tuberculose dans votre organisme, sans que vous manifestiez de tuberculose active.

- Même si les bacilles de la tuberculose sont présents dans votre corps, votre système immunitaire les garde en équilibre.
- Vous n'aurez aucun symptôme et ne vous sentirez pas malade.
- Vous ne pouvez pas transmettre les bacilles de la tuberculose à quiconque.

La tuberculose latente est également connue sous les noms de « infection tuberculeuse », « tuberculose dormante » ou « tuberculose inactive ».

Comment diagnostique-t-on la tuberculose latente ?

Il existe plusieurs tests, tels que le test cutané à la tuberculine et/ou une analyse sanguine, pour confirmer la présence de tuberculose latente.

Pourquoi traiter la tuberculose latente ?

- Il est important de traiter la tuberculose latente pour prévenir le développement d'une tuberculose active à l'avenir.
- En général, l'organisme détruit les germes dès leur inhalation grâce à son système immunitaire. Toutefois, si ce dernier est affaibli, il peut échouer à contenir les germes de la tuberculose, ce qui les active.

Quel est le traitement ?

Le traitement de la tuberculose latente consiste généralement à prendre chaque jour pendant 3 mois un seul comprimé contenant deux antibiotiques associés.

Les germes responsables de la tuberculose sont éliminés très lentement, d'où l'importance de poursuivre le traitement antibiotique jusqu'à la fin. Interrompre le traitement peut augmenter le risque de développer une tuberculose active plus tard.

Vous devrez passer une analyse sanguine afin de vérifier que votre foie fonctionne normalement avant et pendant le traitement.



Rifinah 150/100 mg



Rifinah 300/150 mg



Pyridoxine
Vitamine B6

Y a-t-il des effets indésirables ?

Pendant la prise de ces antibiotiques, votre urine, vos selles, vos larmes ou votre sueur peuvent prendre une teinte rouge ou orange. C'est un effet secondaire inoffensif.
Les lentilles de contact souples peuvent se décolorer.

Les antibiotiques peuvent diminuer l'efficacité de la « pilule » contraceptive et d'autres méthodes contraceptives. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser également une méthode de barrière fiable, comme les préservatifs.
Veuillez en discuter avec votre centre de planification familiale, votre médecin ou un pharmacien.

Veuillez en parler à votre médecin traitant si vous présentez les symptômes suivants :

- des nausées ou des vomissements
- Une jaunisse (coloration jaune du blanc des yeux ou de la peau)
- Éruption cutanée persistante ou démangeaisons
- De la fièvre
- Des fourmillements dans les doigts et les orteils

N'oubliez pas

- Vous devez prendre les antibiotiques tous les jours, 30 minutes avant le petit-déjeuner
- Ne manquez pas une prise
- Évitez l'alcool
- Essayez de vous rendre à tous vos rendez-vous à la clinique

Évitez

Il est important de ne pas utiliser de bancs solaires pendant votre traitement. Lorsque votre peau est exposée à un soleil intense, appliquez une crème solaire à indice de protection élevé. (Certains comprimés antituberculeux peuvent accroître la sensibilité de votre peau aux rayons du soleil.)

Informations complémentaires :

Pour plus d'informations ou de conseils, n'hésitez pas à contacter votre infirmière spécialisée en tuberculose :

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow, Clyde Est et Nord
☎ **0141 201 3900**
Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h (vendredi jusqu'à 16 h 30)

Hôpital général de Gartnavel

Glasgow et Clyde Ouest
☎ **0141 232 2161**
Du lundi au mercredi, de 8 h à 16 h

Hôpital universitaire Queen Elizabeth

Glasgow et Clyde Sud
☎ **0141 451 5862**
Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h

Hôpital New Victoria

Glasgow et Clyde Sud-Ouest
☎ **0141 345 8846**
Du mardi au vendredi, de 9 h à 16 h