
ROMANIAN

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Informaţii despre

Tuberculoză Latentă

(Engleză)



Ce este tuberculoza (TB) Latentă?

TB latentă este atunci când germenii TB sunt prezenţi în corpul dvs., dar nu aveţi TB activă.

- Deşi germenii TB se află în interiorul corpului dvs., sistemul dvs. imunitar îi ţine sub control.
- Nu veţi avea simptome sau nu vă veţi simţi rău.
- Nu puteţi transmite germenii TB altor persoane.

TB latentă poate fi numită şi infecţie TB, TB Dormantă sau TB Inactivă.

Cum se diagnostichează TB Latentă?

Există diverse teste care pot include un test cutanat la tuberculină şi/ sau un test de sânge pentru a confirma TB latentă.

De ce să tratăm tuberculoza latentă?

- TB latentă trebuie tratată pentru a preveni dezvoltarea TB active în viitor.
- De obicei, sistemul imunitar al organismului distruge germenii după ce aceştia au fost inhalaţi. Cu toate acestea, dacă sistemul imunitar al organismului este slăbit, este posibil să nu reuşească să ţină germenii TB sub control. Acest lucru permite germenilor TB să devină activi.

Care este Tratamentul?

Tratamentul pentru TB Latentă constă, de obicei, în două antibiotice administrate împreună într-un singur comprimat, în fiecare zi, timp de 3 luni.

Germenii TB sunt distruşi foarte lent, astfel încât este foarte important să finalizaţi întregul tratament cu antibiotice. Nefinalizarea tratamentului v-ar putea expune riscului de a dezvolta TB activă în viitor.

Va trebui să faceţi un test de sânge pentru a verifica dacă ficatul dumneavoastră funcţionează normal înainte şi în timpul tratamentului.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Piridoxină
Vitamina B6

Există efecte adverse?

În timp ce luaţi antibioticele, este posibil să observaţi că urina, scaunele, lacrimile sau transpiraţia dumneavoastră pot avea o culoare roşie sau portocalie. Acesta este un efect advers inofensiv.
Lentilele de contact moi se pot decolora.

Antibioticele pot face ca „pilula” contraceptivă şi alte metode contraceptive să fie mai puţin eficiente. Aceasta înseamnă că va trebui, de asemenea, să utilizaţi o metodă contraceptivă de barieră sigură, cum ar fi prezervativele.
Vă rugăm să discutaţi despre acest lucru cu clinica dumneavoastră de planificare familială, medicul dumneavoastră sau un farmacist.

Vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră de familie dacă prezentaţi:

- Greaţă sau vărsături
- Icter (îngălbenirea părţii albe a ochiului sau a pielii)
- Erupţie cutanată persistentă sau mâncărime
- Febră
- Furnicături la nivelul degetelor de la mâini sau de la picioare

Reţineţi

- Trebuie să luaţi antibioticele în fiecare zi, cu 30 de minute înainte de micul dejun
- Nu omiteţi nicio doză
- Evitaţi alcoolul
- Încercaţi să vă prezentaţi la toate programările la clinică

Evitați

Nu trebuie să folosiți solarele pe durata tratamentului. Vă rugăm să folosiți o cremă de protecție solară cu un factor mai ridicat atunci când pielea dumneavoastră este expusă la lumina puternică a soarelui. (Unele comprimate antituberculoase vă pot face pielea mai sensibilă la razele soarelui.)

Informații suplimentare:

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi, contactați asistenta medicală TB din zona dvs:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow și Clyde de Est și de Nord
☎ **0141 201 3900**
Luni - Joi 9:00 - 18:00 (Vineri 16:30)

Spitalul General Gartnavel

Glasgow și Clyde West
☎ **0141 232 2161**
Mon - Wed 8am - 4pm

Spitalul Universitar Queen Elizabeth

Glasgow și Clyde South
☎ **0141 451 5862**
Luni - Joi 8:00 - 16:00

Spitalul New Victoria

Glasgow și Clyde West
☎ **0141 345 8846**
Marți - vineri 9:00 - 16:00