RUSSIAN

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Информация о
Латентном туберкулёзе
(Русский)



Латентный ТБ

- **Бактерии туберкулёза находятся в организме, но не размножаются**
- **Человек не чувствует себя больным, и симптомы отсутствуют**
- **Не передаётся от человека к человеку.**
- **Может перейти в активную форму туберкулёза.**

Активный туберкулёз

- **Бактерии туберкулёза активны и размножаются в организме**
- **Человек чувствует себя больным, и у него появляются симптомы**
- **Может передаваться от человека к человеку**
- **При отсутствии лечения может привести к смерти**

Что такое латентный туберкулёз (ТБ)?

Латентный туберкулёз — это состояние, при котором бактерии туберкулёза присутствуют в организме, но активного туберкулёза нет.

- Хотя бактерии туберкулёза находятся в вашем организме, иммунная система держит их под контролем.
- У вас не будет никаких симптомов, и вы не будете чувствовать себя больным.
- Вы не можете передать бактерии туберкулёза другим людям.

Латентный туберкулёз также может называться туберкулёзной инфекцией, спящим или неактивным туберкулёзом.

Как диагностируют латентный туберкулёз?

Для подтверждения латентного туберкулёза используются различные исследования, которые могут включать туберкулиновую кожную пробу и/или анализ крови.

Why Treat Latent TB?

- Латентный туберкулёз необходимо лечить, чтобы предотвратить развитие активного туберкулёза в будущем.
- Обычно иммунная система организма уничтожает бактерии после их попадания в организм при вдыхании. Однако если иммунная система ослаблена, она может быть не в состоянии удерживать бактерии туберкулёза под контролем. В результате бактерии могут стать активными.

Как проводится лечение?

Лечение латентного туберкулёза обычно включает два антибиотика, объединённых в одной таблетке, которую принимают ежедневно в течение 3 месяцев.

Бактерии туберкулёза уничтожаются очень медленно, поэтому крайне важно пройти полный курс лечения антибиотиками. Если не завершить курс лечения, в будущем может возникнуть риск развития активного туберкулёза.

До начала лечения и во время него вам необходимо будет сдавать анализ крови, чтобы проверить нормальную работу печени.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Pyridoxine
Vitamin B6

Есть ли побочные эффекты?

Во время приёма антибиотиков вы можете заметить, что моча, стул, слёзы или пот приобретают красный или оранжевый цвет. Это безвредный побочный эффект.
Мягкие контактные линзы могут изменить цвет.

Антибиотики могут снизить эффективность противозачаточных таблеток и других методов контрацепции. Это означает, что вам также необходимо использовать надёжный барьерный метод контрацепции, например презервативы.
Пожалуйста, обсудите этот вопрос со специалистом клиники планирования семьи, врачом или фармацевтом.

Сообщите своему врачу общей практики (GP), если у вас возникнут:

- Тошнота или рвота
- Желтуха (пожелтение белков глаз или кожи)
- Стойкая сыпь или зуд
- Повышенная температура
- Покалывание в пальцах рук или ног

Помните

- Антибиотики необходимо принимать каждый день за 30 минут до завтрака
- Не пропускайте приём препарата
- Избегайте употребления алкоголя
- Старайтесь посещать все назначенные приёмы в клинике

Чего следует избегать

Во время лечения не следует пользоваться солярием. Если ваша кожа подвергается воздействию сильного солнечного света, используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты (SPF). Некоторые противотуберкулёзные препараты могут повышать чувствительность кожи к солнечным лучам

Дополнительная информация:

Если вам нужна дополнительная информация или консультация, обратитесь к местной медсестре по туберкулёзу:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow и Clyde East и North
☎ **0141 201 3900**
Пн–Чт: 9am - 6pm (пятница 4:30pm)

Gartnavel General Hospital

Glasgow и Clyde West
☎ **0141 232 2161**
Пн–Ср: 8am - 4pm

Queen Elizabeth University Hospital

Glasgow и Clyde South
☎ **0141 451 5862**
Пн–Чт: 8am - 4pm

New Victoria Hospital

Glasgow и Clyde South West
☎ **0141 345 8846**
Tue - Fri 9am - 4pm