
SIMPLIFIED CHINESE

NHS
Greater Glasgow and Clyde

关于

潜伏性结核病的信息

（中文）



什么是潜伏性结核病（TB）？

潜伏性结核病是指结核菌存在于您体内，但您并未患有活动性结核病。

- 尽管结核病菌存在于您的体内，但您的免疫系统正将其控制住。
- 您不会出现任何症状或感到不适。
- 您不会将结核病菌传染给其他人。

潜伏性结核病也可称为结核感染、休眠性结核病或非活动性结核病。

如何诊断潜伏性结核病？

有多种检测方法可用于确认潜伏性结核病，其中包括结核菌素皮肤试验和/或血液检测。

为什么要治疗潜伏性结核病？

- 潜伏性结核病需要治疗，以防止您日后发展为活动性结核病。
- 通常，人体免疫系统会在病菌被吸入后将其消灭。然而，如果免疫系统功能减弱，可能无法有效控制结核病菌，从而导致病菌变得活跃。

治疗方法是什么？

潜伏性结核病的治疗通常是每天服用一片含有两种抗生素的复方药片，疗程为3个月。

结核菌的杀灭过程非常缓慢，因此务必完成整个疗程的抗生素治疗。如果未能完成疗程，您日后可能会面临患上活动性结核病的风险。

在治疗前及治疗期间，您需要进行血液检查，以确认肝脏功能正常。



Rifinah 150/100毫克



Rifinah 300/150毫克



Pyridoxine
维生素B6

会有副作用吗？

在服用抗生素期间，您可能会发现尿液、粪便、泪液或汗液呈现红色或橙色。这是一种无害的副作用。
软性隐形眼镜可能会变色。

抗生素可能会降低避孕’药’及其他避孕措施的有效性。这意味着您还需要采取可靠的屏障避孕法，例如使用避孕套。
请就此咨询您的计划生育诊所、医生或药剂师。

如果您出现以下情况，请告知您的全科医生：

- 恶心或呕吐
- 黄疸（眼白或皮肤发黄）
- 持续性皮疹或瘙痒
- 发烧
- 手指和脚趾刺痛感

记住

- 您必须每天在早餐前30分钟服用抗生素。
- 请勿漏服
- 避免饮酒
- 尽量参加所有诊所预约

避免

治疗期间请勿使用日光浴床。皮肤暴露于强烈阳光下时，请使用高倍防晒霜。（某些抗结核药物会增加皮肤对阳光的敏感性。）

更多信息：

如果您需要更多信息或建议，请联系您当地的结核病护士：

Glasgow Royal Infirmary 格拉斯哥皇家医院

Glasgow and Clyde East and North 格拉斯哥与克莱德东部及北部
☎ **0141 201 3900**
周一至周四上午 9 点至下午 6 点（周五下午 4:30）

Gartnavel General Hospital 加特纳维尔综合医院

Glasgow and Clyde West 格拉斯哥与克莱德西区
☎ **0141 232 2161**
周一至周三 上午8点至下午4点

Queen Elizabeth University Hospital 伊丽莎白女王大学医院

Glasgow and Clyde South 格拉斯哥与克莱德南区
☎ **0141 451 5862**
周一至周四 上午8点至下午4点

New Victoria Hospital 新维多利亚医院

Glasgow and Clyde South West 格拉斯哥与克莱德西南部
☎ **0141 345 8846**
周二至周五 上午9点至下午4点