
SPANISH

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Información sobre

Tuberculosis latente

(Español)



TB latente

- La TB está presente, pero no crece en el organismo
- No hace que la persona se sienta mal ni tenga síntomas
- **No se** puede transmitir de una persona a otra
- Puede evolucionar a enfermedad de TB

Enfermedad de TB

- La TB está activa y crece en el organismo
- Hace que la persona se sienta mal y tenga síntomas
- **Se** puede transmitir de una persona a otra
- Puede causar la muerte si no se trata

¿Qué es la tuberculosis latente (TB)?

La TB latente se produce cuando los gérmenes de la TB están presentes en su organismo, pero usted no tiene TB activa.

- Aunque los gérmenes de la TB están en su organismo, su sistema inmunitario los mantiene bajo control
- No tendrá ningún síntoma ni se sentirá mal.
- No puede transmitir los gérmenes de la TB a ninguna otra persona.

La TB latente también puede denominarse infección por TB, TB durmiente o TB inactiva.

¿Cómo se diagnostica la TB latente?

Existen varias pruebas que pueden incluir una prueba cutánea de tuberculina y/o un análisis de sangre para confirmar la TB latente.

¿Por qué tratar la TB latente?

- La TB latente debe tratarse para evitar que desarrolle TB activa en el futuro.
- Normalmente, el sistema inmunitario del organismo destruye los gérmenes una vez inhalados. Sin embargo, si el sistema inmunitario está debilitado, puede que no consiga mantener los gérmenes de la TB bajo control. Esto permite que los gérmenes de la TB se activen.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento de la TB latente suele consistir en dos antibióticos administrados juntos en un comprimido cada día durante 3 meses.

Los gérmenes de la TB se eliminan muy lentamente, por lo que es muy importante completar todo el tratamiento con antibióticos. No completar el tratamiento podría ponerle en riesgo de desarrollar TB activa en el futuro.

Necesitará un análisis de sangre para comprobar que su hígado funciona con normalidad antes y durante el tratamiento.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Piridoxina
Vitamina B6

¿Hay efectos secundarios?

Mientras esté tomando los antibióticos, puede observar que la orina, las deposiciones, las lágrimas o el sudor adquieren un color rojo o naranja. Este es un efecto secundario inofensivo.
Las lentes de contacto blandas pueden decolorarse.

Los antibióticos pueden reducir la eficacia de la píldora anticonceptiva y de otros métodos anticonceptivos. Esto significa que también deberá utilizar un método de barrera fiable, como los preservativos.
Consulte este tema con su clínica de planificación familiar, su médico o un farmacéutico.

Informe a su médico de cabecera si presenta:

- Náuseas o vómitos
- Ictericia (coloración amarillenta de la parte blanca de los ojos o de la piel)
- Erupción cutánea o picor persistentes
- Fiebre
- Hormigueo en los dedos de las manos y de los pies

Recuerde

- Debe tomar los antibióticos todos los días, 30 minutos antes del desayuno
- No omita ninguna dosis
- Evite el alcohol
- Procure acudir a todas las citas de la clínica

Evite

No debe utilizar camas de bronceado durante el tratamiento. Utilice un protector solar de factor alto cuando su piel esté expuesta a luz solar intensa. (Algunos comprimidos contra la tuberculosis pueden hacer que su piel sea más sensible a los rayos del sol).

Más información:

Si necesita más información o asesoramiento, póngase en contacto con su enfermero/a local de TB:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow y Clyde Este y Norte
☎ **0141 201 3900**
Lun - Jue 9:00 - 18:00 (Vie hasta las 16:30)

Gartnavel General Hospital

Glasgow y Clyde Oeste
☎ **0141 232 2161**
Lun - Mié 8:00 - 16:00

Queen Elizabeth University Hospital

Glasgow y Clyde Sur
☎ **0141 451 5862**
Mon - Thurs 8am - 4pm

New Victoria Hospital

Glasgow y Clyde Suroeste
☎ **0141 345 8846**
Mar - Vie 9:00 - 16:00