
TRADITIONAL CHINESE

NHS
Greater Glasgow and Clyde

關於

潛伏性結核病的信息

（Chinese（traditional）中文（繁體））



什麼是潛伏性結核病(TB)？

潛伏性結核病是指結核桿菌存在於體內，但患者沒有出現活動性結核病症狀。

- 雖然結核菌存在於你的體內，但你的免疫系統能夠控制它們。
- 您不會出現任何症狀或感到不適。
- 你不會將結核菌傳染給其他人。

潛伏性結核病也可稱為結核感染、休眠結核病或非活動性結核病。

如何診斷潛伏性結核病？

有多種檢測方法可以確診潛伏性結核病，包括結核菌素皮膚試驗和/或血液檢查。

為什麼要治療潛伏性結核病？

- 潛伏性結核病需要治療，以防止將來發展為活動性結核病。
- 通常情況下，人體的免疫系統會在吸入結核桿菌後將其清除。然而，如果人體的免疫系統虛弱，就可能無法控制結核桿菌，使其重新活躍。

治療方法是什麼？

潛伏性結核病的治療通常是將兩種抗生素合在一起，每天服用一片，療程為 3 個月。

結核桿菌很難被殺死，因此完成整個抗生素療程至關重要。未完成療程可能會增加將來罹患活動性結核病的風險。

在治療前和治療期間，您需要進行血液檢查，以確保您的肝臟功能正常。



Rifinah 150/100毫克



Rifinah 300/150毫克



Pyridoxine
維生素B6

是否有副作用？

服用抗生素期間，您可能會注意到尿液、糞便、眼淚或汗水呈現紅色或橙色。這是無害的副作用。
軟式隱形眼鏡可能會變色。

抗生素會降低避孕藥和其他避孕方法的效力。這意味著您還需要使用可靠的屏障避孕法，例如保險套。
請與您的計劃生育診所、醫生或藥劑師討論此事。

若您有以下情況，請告知您的家庭醫師：

- 噁心或嘔吐
- 黃疸（眼白或皮膚發黃）
- 持續性皮疹或搔癢
- 發燒
- 手指和腳趾刺痛

記住

- 你必須每天服用抗生素，在早餐前30分鐘服用
- 不要漏服一劑
- 避免飲酒
- 盡量按時參加所有門診預約。

避免

治療期間請勿使用日光浴床。皮膚暴露於強烈陽光下時，請使用高倍防曬霜。（某些抗結核藥物會增加皮膚對陽光的敏感度。）

更多資訊：

如果您需要更多資訊或建議，請聯絡您當地的結核病專科護理師：

Glasgow Royal Infirmary 格拉斯哥皇家醫院

Glasgow and Clyde East and North 格拉斯哥和克萊德東部和北部

☎ **0141 201 3900**

週一至週四上午 9 點至下午 6 點（週五下午 4:30）

Gartnavel General Hospital 加特納維爾綜合醫院

Glasgow and Clyde West 格拉斯哥和克萊德西部

☎ **0141 232 2161**

週一至週三 上午8點至下午4點

Queen Elizabeth University Hospital 伊莉莎白女王大學醫院

Glasgow and Clyde South 格拉斯哥和克萊德南部

☎ **0141 451 5862**

週一至週四 上午8點至下午4點

New Victoria Hospital 新維多利亞醫院

Glasgow and Clyde South West 格拉斯哥和克萊德西南部

☎ **0141 345 8846**

週二至週五 上午9點至下午4點