
TURKISH

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Hakkında Bilgilendirme

Gizli (Latent) Tüberküloz

(Türkçe)



Gizli (Latent) Tüberküloz (TB) Nedir?

Gizli tüberküloz, TB bakterilerinin vücudunuzda bulunduğu ancak aktif tüberküloz hastalığınızın olmadığı durumdur.

- TB bakterileri vücudunuzda bulunmasına rağmen, bağışıklık sisteminiz onları kontrol altında tutar.
- Herhangi bir belirti göstermezsiniz veya kendinizi hasta hissetmezsiniz.
- TB bakterilerini başka kişilere bulaştıramazsınız.

Gizli tüberküloz ayrıca TB enfeksiyonu, uykuda (dormant) TB veya inaktif TB olarak da adlandırılabilir.

Gizli Tüberküloz Nasıl Teşhis Edilir?

Gizli tüberkülozu doğrulamak için tüberkülin deri testi ve/veya kan testi dahil olmak üzere çeşitli testler yapılabilir.

Gizli Tüberküloz Neden Tedavi Edilir?

- Gelecekte aktif tüberküloz hastalığı geliştirmenizi önlemek için gizli tüberkülozun tedavi edilmesi gerekir.
- Normalde vücudun bağışıklık sistemi, solunum yoluyla vücuda giren bakterileri yok eder. Ancak bağışıklık sistemi zayıflarsa TB bakterilerini kontrol altında tutamayabilir. Bu durumda TB bakterileri aktif hâle gelebilir.

Tedavisi Nedir?

Gizli tüberküloz tedavisi genellikle iki antibiyotiğin tek bir tablette birleştirilerek 3 ay boyunca her gün alınmasından oluşur.

TB bakterileri çok yavaş öldüğü için antibiyotik tedavisinin tamamlanması son derece önemlidir. Tedavinin tamamlanmaması, gelecekte aktif tüberküloz hastalığı geliştirme riskinizi artırabilir.

Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında karaciğerinizin normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testi yaptırmanız gerekecektir.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Pyridoxine
Vitamin B6

Yan Etkileri Var mı?

Antibiyotikleri kullanırken idrarınızın, dışkınızın, gözyaşlarınızın veya terinizin kırmızı ya da turuncu renge dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Bu, zararsız bir yan etkidir.
Yumuşak kontakt lenslerin rengi değişebilir.

Antibiyotikler, doğum kontrol hapının ve diğer doğum kontrol yöntemlerinin etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle prezervatif gibi güvenilir bir bariyer yöntemi de kullanmanız gerekecektir.
Lütfen bu konuyu aile planlaması kliniğiniz, doktorunuz veya eczacınızla görüşün.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız lütfen aile hekiminize (GP) bildirin:

- Bulantı veya kusma
- Sarılık (göz aklarının veya cildin sararması)
- Geçmeyen döküntü veya kaşıntı
- Ateş
- El ve ayak parmaklarında karıncalanma

Unutmayın

- Antibiyotikleri her gün, kahvaltıdan 30 dakika önce almalısınız.
- Doz atlamayın.
- Alkolden kaçının.
- Klinikteki tüm randevularınıza katılmaya çalışın.

Kaçınılması Gerekenler

Tedaviniz sırasında solaryum kullanmamalısınız. Cildiniz güçlü güneş ışığına maruz kaldığında yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanın. (Bazı tüberküloz ilaçları cildinizi güneş ışınlarına karşı daha hassas hâle getirebilir.)

Daha Fazla Bilgi:

Daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bölgenizdeki TB (Tüberküloz) Hemşiresi ile iletişime geçin:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow ve Clyde East ve North
☎ 0141 201 3900
Pazartesi- Perşembe 9am - 6pm (Fri 4:30pm)

Gartnavel General Hospital

Glasgow ve Clyde West
☎ 0141 232 2161
Pazartesi–Çarşamba 8am - 4pm

Queen Elizabeth University Hospital

Glasgow ve Clyde South
☎ 0141 451 5862
Pazartesi–Perşembe 8am - 4pm

New Victoria Hospital

Glasgow ve Clyde South West
☎ 0141 345 8846
Salı–Cuma: 9am - 4pm