VIETNAMESE

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Thông tin về

BỆNH LAO TIỀM ẨN

(Tiếng Việt)



Bệnh lao tiềm ẩn là gì?

Lao tiềm ẩn là tình trạng vi khuẩn lao hiện diện trong cơ thể bạn nhưng bạn không mắc bệnh lao thể hoạt động.

- Mặc dù vi khuẩn lao nằm trong cơ thể, hệ miễn dịch của bạn vẫn đang kiểm soát được chúng.
- Bạn sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào hay cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.
- Bạn không thể lây truyền vi khuẩn lao sang người khác.

Lao tiềm ẩn còn được gọi là nhiễm lao, lao ở trạng thái ngủ hoặc lao không hoạt động.

Làm thế nào để chẩn đoán lao tiềm ẩn?

Có nhiều loại xét nghiệm khác nhau, bao gồm xét nghiệm da tuberculin và/hoặc xét nghiệm máu để xác định tình trạng lao tiềm ẩn.

Tại sao cần điều trị lao tiềm ẩn

- Cần điều trị lao tiềm ẩn để ngăn ngừa nguy cơ phát triển thành bệnh lao thể hoạt động trong tương lai.
- Thông thường, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ tiêu diệt vi khuẩn lao ngay khi chúng xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên, nếu hệ miễn dịch bị suy yếu, cơ thể có thể không kiểm soát được vi khuẩn lao, tạo điều kiện cho chúng chuyển sang trạng thái hoạt động.

Phương pháp điều trị là gì?

Việc điều trị lao tiềm ẩn thường bao gồm hai loại thuốc kháng sinh được kết hợp trong một viên thuốc duy nhất, uống hàng ngày trong vòng 3 tháng.

Vi khuẩn lao bị tiêu diệt rất chậm, do đó việc hoàn tất toàn bộ liệu trình điều trị kháng sinh là vô cùng quan trọng. Nếu không hoàn tất liệu trình, bạn có thể đối mặt với nguy cơ phát triển thành bệnh lao thể hoạt động trong tương lai.

Bạn sẽ cần thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng gan trước và trong quá trình điều trị.



Rifinah 150/100mg



Rifinah 300/150mg



Pyridoxine
Vitamin B6

Thuốc có gây tác dụng phụ không?

Trong thời gian dùng thuốc kháng sinh, bạn có thể thấy nước tiểu, phân, nước mắt hoặc mồ hôi chuyển sang màu đỏ hoặc cam. Đây là một tác dụng phụ vô hại.
Kính áp tròng mềm có thể bị đổi màu.

Thuốc kháng sinh có thể làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai và các biện pháp tránh thai khác. Do đó, bạn cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai cơ học đáng tin cậy, chẳng hạn như bao cao su.
Vui lòng trao đổi vấn đề này với phòng khám kế hoạch hóa gia đình, bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Hãy thông báo cho bác sĩ gia đình nếu bạn gặp các triệu chứng sau:

- Buồn nôn hoặc nôn
- Vàng da (vàng lòng trắng mắt hoặc da)
- Phát ban hoặc ngứa kéo dài
- Sốt
- Cảm giác tê rần ở ngón tay và ngón chân

HÃY NHỚ

- Bạn phải uống thuốc kháng sinh mỗi ngày, 30 phút trước bữa sáng
- Không được bỏ liều
- Tránh uống rượu bia
- Cố gắng đến khám đầy đủ theo lịch hẹn của phòng khám

TRÁNH ĐI

Bạn không nên sử dụng giường phơi nắng trong quá trình điều trị. Vui lòng sử dụng kem chống nắng có yếu tố cao khi da của bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mạnh. (Một số loại thuốc chống lao có thể làm cho làn da của bạn nhạy cảm hơn với tia nắng.)

THÔNG TIN THÊM:

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc lời khuyên, hãy liên hệ với Y tá lao tại địa phương của bạn:

Glasgow Royal Infirmary

Glasgow và Clyde phía Đông và phía Bắc

☎ **0141 201 3900**

Thứ 2 – thứ 5 9 giờ sáng – 6 giờ chiều (Thứ 6: 4:30 chiều)

Bệnh viện đa khoa Gartnavel

Glasgow và Clyde West

☎ **0141 232 2161**

Thứ Hai-Thứ Tư 8 giờ sáng-4 giờ chiều

Bệnh viện đại học Queen Elizabeth

Glasgow và Clyde phía Nam

☎ **0141 451 5862**

Thứ Hai-Thứ Tư 8 giờ sáng-4 giờ chiều

Bệnh viện New Victoria

Glasgow và Clyde phía Tây Nam

☎ **0141 345 8846**

Thứ Ba-Thứ Sáu9 giờ sáng-4 giờ chiều