


# Simptomele rujeolei

Simptomele rujeolei încep de obicei între **10 și 12 zile** după infectarea cu virusul. Uneori poate dura **până la 21 de zile** până când apar simptomele.

Rujeola începe de obicei cu **simptome asemănătoare răcelii**.  
Primul Simptomele rujeolei includ:



o temperatură  
ridicăta



Nas mucos  
sau înfundat



ochi roșii,  
dureroși, apoși



strănut



tuse



**Câteva zile mai târziu**, pot apărea mici pete albe pe interiorul obrazilor și pe spatele buzelor. Aceste pete durează de obicei câteva zile.



**O erupție cutanată apare de obicei la 2 până la 4 zile** după debutul simptomelor asemănătoare răcelii. Erupția începe pe față și în spatele urechilor înainte de a se răspândi pe restul corpului.



**Petele erupției cutanate cauzate de rujeolă pot fi uneori ridicate.** Se pot uni pentru a forma pete. De obicei, nu provoacă mâncărimi.



**Erupția cutanată arată maro sau roșie pe pielea albă.** Poate fi mai greu de văzut pe pielea maro și neagră.


# Cazurile de rujeolă sunt în creștere în zona dumneavoastră.

Rujeola este o **boală extrem de contagioasă** care poate duce la **boală gravă**.

Cea mai bună modalitate de a te proteja pe tine, familia ta și comunitatea ta este **să te vaccinezi împotriva rujeolei cu vaccinul MMR**. Aceasta este gratuită, sigură și foarte eficientă și se administrează în două doze.

Poate fi administrat **oricui are vârsta peste 12 luni**, cu excepția femeilor însărcinate și a celor cu un sistem imunitar slăbit.

Pentru a proteja comunitatea, NHSGGC oferă **sesiuni suplimentare de vaccinare MMR în zona dumneavoastră**. Îi încurajăm pe toți cei care nu au fost vaccinați cu două doze de ROR să participe la acestea.



Pentru informații actualizate despre sesiunile de vaccinare MMR din zona dumneavoastră, vizitați **[www.nhsggc.scot/generalvaccinations](http://www.nhsggc.scot/generalvaccinations)**

