

TB



د توبرکلوز د درملنې
لارښود
(پښتو)

د مشورې لپاره اړیکه ونیسئ:

توبرکلوز:

توبرکلوز (TB) یوه باکتریا (میکروب) ده چې د بدن هره برخه اغېزمنولای شي، خو تر ټولو ډېره د سږو پر برخه اغېز کوي. که تاسو د ډاکټر له خوا درته ټاکل شوي انټي بیوټیک گولی په سمه اندازه او د ټاکلي مودې لپاره واخلئ، نری رنځ په بشپړه توګه درمل کېدای شي. تر هغه وخته پورې د گوليو له اخیستلو څخه مه درېږئ، څو چې ستاسو ډاکټر یا د توبرکلوز نرس تاسو ته د بندولو لارښوونه ونه کړي.

د توبرکلوز درمل:

تاسو به لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره درملو ته اړتیا ولرئ، او ځینې وختونه ښایي د درملنې موده تر دې هم اوږده شي. د توبرکلوز درملنه په لومړیو کې د 3 یا 4 بېلابېلو ډولونو انټي بیوټیک گوليو په وسیله کېږي، چې وروسته د درملنې د پاتې مودې لپاره یې شمېر 2 یا 3 ډوله گوليو ته را کمېږي.

د توبرکلوز درمل څنګه واخلئ؟

- تاسو باید هره ورځ گولی واخلئ (د سهار له ناشتې څخه 30 دقیقې مخکې).
- ټولې گولی یو ځای، د سهار په وخت کې، د یوه واحد دوز په توګه واخلئ.
- هېڅ دوز مه پرېږدئ. (که سهار مو د گوليو اخیستل هېر کړل، نو د ورځې په وروستیو کې یې واخلئ.)
- مه پرېږدئ چې گولی مو ختمې شي؛ مخکې له دې چې موجودې گولی مو پای ته ورسېږي، نوې اندازه درمل واخلئ.

له څه شي څخه ډډه وکړئ:

د توبرکلوز درملنې پر مهال باید د لمر له مصنوعي بسترونو (Sunbeds) څخه استفاده ونه کړئ. کله چې ستاسو پوستکي د قوي لمر وړانګو ته مخامخ وي، مهرباني وکړئ د لمر SPF لرونکي د لمر ضد کریم (Sun cream) وکاروئ. (د توبرکلوز ضد ځینې گولی کولای شي ستاسو پوستکي د لمر وړانګو پر وړاندې لا حساس کړي.)

جانبی عوارض:

- تاسو ښایي متوجه شئ چې ادرار، خوله او اوښکي مو سور یا نارنجي رنګ پیدا کوي. دا یو بی ضرره جانبي عارضه ده. (نرمې د سترګو تماس لینزونه (Soft contact lenses) هم ښایي رنګ بدل کړي.)

- د توبرکلوز ضد گولی کولای شي د امیندواری د مخنیوي گولی (Oral contraceptive pill) او د امیندواری د مخنیوي ځینې نورې طریقې لري اغېزمنې کړي. دا معنا لري چې تاسو به د امیندواری د مخنیوي لپاره د باوري خنډي طریقې لکه کانډوم څخه هم استفاده کوئ. د امیندواری د مخنیوي د بلې طریقې په اړه د مشورې لپاره له خپل ډاکټر یا درمل جوړونکي (فارمسټ) سره خبرې وکړئ.

- کله چې تاسو د توبرکلوز ضد گولی اخلئ، بنایي ستاسو ډاکټر اړتیا ولري چې د نورو درملو اندازه بدله کړي. (وارفارین (Warfarin)، د تشنج ضد درمل (Anticonvulsants)، سټرایډونه (Steroids) او میتادون (Methadone) بې ځینې بېلګې دي؛ خو ستاسو ډاکټر به د اړتیا سره سم د دغو درملو اندازه تنظیم کړي.)

که تاسو د توبرکلوز ضد درملو په اخیستلو کې ستونزه لرئ، درمل مه بندوئ او هېڅ دوز مه پرېږدئ. د مرستې لپاره له خپل ډاکټر یا د توبرکلوز له نرس سره اړیکه ونیسئ.

که لاندې له یادو شوو جانبې عوارضو څخه کوم یو درته پېښ شي، سمدستي د مشورې لپاره د توبرکلوز له نرس یا خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ:

- کانګې کول
- تبه
- د لید اختلال
- دوامداره د پوستکي دانې یا خارښت
- د ګوتو یا د پښو د ګوتو د سوزش، مورمور کېدو یا بې حسۍ احساس

خپل درمل له وخته مخکې مه بندوئ:

کله چې مو روغتیا ښه شي، د دې له امله مه هڅیږئ چې درمل له ټاکلې مودې مخکې بند کړئ.

که تاسو درمل له وخته مخکې بند کړئ، باکټریاوې به لا هم وده وکړي او درملنه به یې لا ستونزمنه شي.

کېدای شي تاسو ته اړتیا وي چې د اوږدې مودې لپاره ډېرې گولۍ واخلئ، ځکه باکټریاوې بنایي د انټي بیوټیک درملنې پر وړاندې مقاومت پیدا کړی وي.

دا معنا لري چې انټي بیوټیکونه نور نشي کولای ستاسو په بدن کې موجودې باکټریاوې له منځه یوسي.

همدارنګه، تاسو له دې خطر سره مخ کېدای شئ چې د توبرکلوز باکټریاوې خپلې کورنۍ، ملګرو یا نورو هغو کسانو ته چې له هغوی سره وخت تېروئ، انتقالې کړئ.

د توپرکلوز (TB) لپاره کارېدونکي درمل:

یا کله ناکله 2-3 ډوله انټي بیوټیکونه په یوه گولی کې یوځای ترکیب شوي وي.

	Voractiv (وراکتیو)
	Rifater (ریفاتر)
	Rifinah (ریفیناه)
	Ethambutol (اتامبوتول)

د توپرکلوز درمل هم کېدای شي په لاندې ډول تجویز شي:

	Rifampicin (ریفامپیسین)
	Isoniazid (ایزونیازید)
	Pyrazinamide (پیرازینامید)
	Pyridoxine (Vitamin B6) (پیریدوکسین) (ویټامین B6)

په یاد ولری:

- نری رنځ (TB) د سمې درملنې په وسیله په بشپړه توګه درمل کېدای شي.
- تاسو باید خپل د انټي بیوټیک گولی هره ورځ، د ډاکټر د سپارښتنې سره سم واخلئ.
- د انټي بیوټیک گولی مه بندوئ، تر هغه چې ستاسو ډاکټر یا نرس تاسو ته د بندولو لارښوونه ونه کړي.
- هڅه وکړئ چې د کلینیک ټولو ټاکل شویو ملاقاتونو ته حاضر شئ.