

ਟੀਬੀ



ਟੀਬੀ-ਵਰਿਧੀ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਗਾਈਡ
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਟਊਬਰਕਊਲੋਸਿਸ (ਟੀ.ਬੀ.)

ਟਊਬਰਕਊਲੋਸਿਸ (ਟੀ.ਬੀ.) ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਕੀਟਾਨੂ) ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸਿ ਵੀ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਬੀ (TB) ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।

ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਟੀਬੀ (TB) ਦਾ ਇਲਾਜ 3 ਜਾਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਵਿੰ ਲੈਣੀ ਹੈ

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ) ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ (ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ) ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਵੋ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਛੱਡੋ। (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੱਚ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਲੈ ਲਵੋ)।
- ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ; ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਲਵੋ।

ਬਚੋ

ਟੀ.ਬੀ. (TB) ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਸਨ ਬੈੱਡ' (sun beds) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਸਨ-ਕਰੀਮ (sun cream) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। (ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਰਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

- ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਿਮਾਬ, ਪਸੀਨਾ, ਹੰਝੂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। (ਨਰਸ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸ ਦਾ ਰੰਗ ਫੀਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

- ਟੀਬੀ (ਤਪਦਕਿ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਰਭ-ਨਰਿਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਸਿੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 'ਬੈਰੀਅਰ' ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕੰਡੋਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਰਭ-ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਸਿੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਚਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਵਾਰਫਰੀਨ, ਐਂਟੀ-ਕਨਵਲਸੈਂਟਸ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. (TB) ਵਰਿਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (side effects) ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਬੀ (TB) ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

- ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
- ਬੁਖਾਰ
- ਦੇਖਣ ਵੱਚਿ ਦੱਕਤ
- ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ
- ਉਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲਾਂ ਵੱਚਿ ਝਰਨਾਹਟ

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬਹਿਤਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਚਿ ਨਾ ਪਵੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ **ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ** ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਉਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ **ਰੋਧਕ ਬਣ** ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੀ.ਬੀ. (TB) ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ **ਪਰਿਵਾਰ**, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ **ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ** ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤਿਉਂਦੇ ਹੋ।

ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਗਈ:

ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਵੱਚ 2-3 ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Voractiv (ਵੋਰਾਸਟੀ)		
Rifater (ਰਿਫਾਟਰ)		
Rifinah (ਰਿਫਿਨਾਹ)		
Ethambutol (ਈਥਾਮਬੁਟੋਲ)		

ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

Rifampicin (ਰਿਫਾਮਪਸਿਨਿ)		
Isoniazid (ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ)		
Pyrazinamide (ਪਾਈਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾਈਡ)		
Pyridoxine (vitamin B6) (ਪਾਈਰੀਡੋਕਸਨਿ) (ਵਿਟਾਮਿਨ B6)		

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

- ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਟੀ.ਬੀ. (TB) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਵਿੱ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ
- ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਾਂ) 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ