

# TB



## Un ghid pentru Tratamentul Antituberculos (Romanian)

Pentru sfaturi, contactați:

## Tuberculoza (TB)

Tuberculoza (TB) este o bacterie (microb) care poate afecta orice parte a corpului, dar afectează cel mai frecvent plămânii.

TB poate fi vindecată complet dacă luați comprimatele antibiotice corecte pentru perioada corectă de timp.

Întrerupeți administrarea comprimatelor numai atunci când vă spune medicul dumneavoastră sau asistenta medicală pentru tuberculoză.

## Medicamente pentru TB

Va trebui să luați medicamente timp de cel puțin 6 luni, uneori mai mult.

TB este tratată inițial cu 3 sau 4 tipuri diferite de comprimate antibiotice, după care numărul acestora este redus la 2 sau 3 pentru restul duratei tratamentului.

## Cum să luați medicamentele pentru TB

- Trebuie să luați comprimatele în fiecare zi (cu 30 de minute înainte de micul dejun).
- Luați toate comprimatele împreună, ca o singură doză, dimineața.
- Nu omiteți nicio doză. (Luați-le mai târziu în timpul zilei dacă uitați să vă luați comprimatele dimineața.)
- Nu rămâneți fără comprimate; procurați o nouă rezervă înainte de a le termina.

## Evitați

Nu trebuie să folosiți solarele pe durata tratamentului pentru TB. Vă rugăm să folosiți o cremă de protecție solară cu un factor mai ridicat atunci când pielea dumneavoastră este expusă la lumina puternică a soarelui. (Unele comprimate antituberculoase vă pot face pielea mai sensibilă la razele soarelui.)

## Efecte adverse

- Este posibil să observați că urina, transpirația și lacrimile dumneavoastră vor deveni de culoare roșie sau portocalie. Acesta este un efect secundar inofensiv. (Lentilele de contact moi se pot decolora.)

- Comprimatele antituberculoase pot face ca „pilula” contraceptivă și alte metode contraceptive să fie mai puțin eficiente. Aceasta înseamnă că va trebui, de asemenea, să utilizați o metodă contraceptivă de barieră sigură, cum ar fi prezervativele. Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul pentru recomandări cu privire la o altă metodă contraceptivă.
- Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice doza altor medicamente în timp ce luați comprimate antituberculoase. (Warfarina, anticonvulsivantele, steroizii și metadona sunt câteva exemple, dar medicul dumneavoastră le va ajusta după cum este necesar.)

Dacă aveți dificultăți cu medicamentele antituberculoase, nu încetați să le luați și nu omiteți doze. Contactați medicul dumneavoastră sau asistenta medicală pentru tuberculoză pentru ajutor.

**Contactați imediat asistenta medicală pentru tuberculoză sau medicul dumneavoastră pentru recomandări dacă manifestați oricare dintre efectele adverse enumerate mai jos:**

- Vărsături
- Febră
- Tulburări de vedere
- Erupție cutanată sau mâncărime persistentă
- Funicături la nivelul degetelor de la mâini sau de la picioare

**Nu întrerupeți administrarea medicamentelor mai devreme**

**Nu fiți tentat(ă) să întrerupeți tratamentul mai devreme deoarece începeți să vă simțiți mai bine.**

Dacă întrerupeți tratamentul mai devreme, bacteriile vor continua să se înmulțească și vor deveni **mai greu** de tratat.

Este posibil să aveți nevoie de mai multe comprimate pentru o **perioadă mai lungă**, deoarece bacteriile este posibil să fi **devenit rezistente** la tratamentul cu antibiotice.

Aceasta înseamnă că antibioticele nu mai pot distruge bacteriile din organismul dumneavoastră.

De asemenea, este posibil să **riscați să răspândiți bacteriile TB familiei, prietenilor sau altor persoane cu care petreceți timp.**

## Medicamente utilizate pentru TB:

Sau, uneori, 2-3 antibiotice sunt combinate într-un singur comprimat

|            |                                                                                   |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Voractiv   |  |                                                                                   |
| Rifater    |  |                                                                                   |
| Rifinah    |  |  |
| Ethambutol |  |  |

Medicamentele pentru TB pot fi, de asemenea, prescrise după cum urmează:

|                             |                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rifampicină                 |    |  |
| Isoniazidă                  |    |                                                                                   |
| Pirazinamidă                |  |                                                                                   |
| Piridoxină<br>(Vitamina B6) |  |                                                                                   |

## NU UITAȚI:

- TB poate fi vindecată cu tratamentul corect
- Trebuie să luați comprimatele antibiotice în fiecare zi, conform prescripției
- Nu întrerupeți administrarea comprimatelor antibiotice decât dacă medicul sau asistenta medicală vă spune să faceți acest lucru
- Încercați să vă prezentați la toate programările la clinică