

TB



Guía para el tratamiento antituberculoso (Español)

Para asesoramiento, contacte con:

Tuberculosis (TB)

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana (germen) que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque afecta con mayor frecuencia a los pulmones.

La TB puede curarse por completo si toma los comprimidos antibióticos correctos durante el tiempo indicado.

Deje de tomar los comprimidos únicamente cuando se lo indique su médico o enfermero/a de TB.

Medicación para la TB

Deberá tomar medicación durante al menos 6 meses, a veces durante más tiempo.

Inicialmente, la TB se trata con 3 o 4 tipos diferentes de comprimidos antibióticos; posteriormente se reduce a 2 o 3 durante el resto del tratamiento.

Cómo tomar la medicación para la TB

- Debe tomar los comprimidos todos los días (30 minutos antes del desayuno).
- Tome todos los comprimidos juntos, en una sola dosis por la mañana.
- No omita ninguna dosis. (Si olvida los comprimidos por la mañana, tómelos más tarde ese mismo día).
- No se quede sin comprimidos; obtenga una nueva provisión antes de que se terminen.

Evite

No debe utilizar camas solares durante el tratamiento de la TB. Utilice una crema solar con un factor de protección alto cuando su piel esté expuesta a luz solar intensa. (Algunos comprimidos antituberculosos pueden hacer que la piel sea más sensible a los rayos del sol).

Efectos secundarios

- Puede notar que la orina, el sudor y las lágrimas adquieren un color rojo o naranja. Este efecto secundario es inofensivo. (Las lentes de contacto blandas pueden cambiar de color).

- Los comprimidos antituberculosos pueden reducir la eficacia de la píldora anticonceptiva oral y de otros métodos anticonceptivos. Esto significa que también deberá utilizar un método de barrera fiable, como los preservativos. Consulte a su médico o farmacéutico para recibir asesoramiento sobre un método anticonceptivo diferente.
- Es posible que su médico tenga que modificar la dosis de otros medicamentos mientras toma comprimidos antituberculosos. (La warfarina, los anticonvulsivos, los esteroides y la metadona son algunos ejemplos; su médico ajustará las dosis según sea necesario).

Si tiene dificultades con la medicación antituberculosa, no deje de tomarla ni omita dosis. Póngase en contacto con su médico o enfermero/a de TB para recibir ayuda.

Póngase en contacto inmediatamente con el/la enfermero/a de TB o con su médico para recibir asesoramiento si presenta alguno de los efectos secundarios indicados a continuación:

- Vómitos
- Fiebre
- Alteraciones visuales
- Erupción o picor persistentes
- Hormigueo en los dedos de las manos o de los pies

No deje de tomar la medicación antes de tiempo

No caiga en la tentación de dejar la medicación antes de tiempo porque empiece a sentirse mejor.

Si deja la medicación antes de tiempo, las bacterias seguirán multiplicándose y serán **más difíciles** de tratar.

Es posible que necesite tomar más comprimidos durante un período de tiempo **más largo**, ya que las bacterias pueden haberse **vuelto resistentes** al tratamiento antibiótico.

Esto significa que los antibióticos ya no pueden eliminar las bacterias de su organismo.

También puede correr **el riesgo de transmitir las bacterias de la TB** a su **familia**, amigos u otras personas con las que pase tiempo.

Medicación utilizada para la TB:

A veces se combinan 2-3 antibióticos en un solo comprimido

Voractiv		
Rifater		
Rifinah		
Etambutol		

La medicación para la TB también puede recetarse de la siguiente forma:

Rifampicina		
Isoniazida		
Pirazinamida		
Piridoxina (vitamina B6)		

RECUERDE:

- La TB puede curarse con el tratamiento correcto
- Debe tomar los comprimidos antibióticos todos los días según lo prescrito
- No deje de tomar los comprimidos antibióticos a menos que su médico o enfermero/a se lo indique
- Intente acudir a todas las citas de la clínica