

結核病



抗結核治療指南

(繁體中文 Chinese Traditional)

如需諮詢，請聯絡：

結核病（TB）

結核病（TB）是由細菌（病菌）引起的，它可以影響身體的任何部位，但最常影響肺部。

如果您在正確的時間內服用正確的抗生素藥片，結核病就可以完全治癒。

只有當你的醫生或結核病專科護士告訴你停止服用這些藥片時，你才能停止服用。

結核病藥物

您至少需要服用藥物 6 個月，有時甚至會更長。

結核病最初使用 3 或 4 種不同的抗生素片劑進行治療，然後在剩餘的療程中減少到 2 或 3 種。

如何服用結核病藥物

- 您必須每天服用藥片（早餐前 30 分鐘）。
- 請於早晨一次服用所有藥片。
- 不要漏服。（如果早上忘記服藥，請在當天晚些時候服用。）
- 不要讓藥片用完，在用完之前及時補充。

避免

在結核病治療期間，不應使用日光浴床。當皮膚暴露在強烈陽光下時，請使用更高係數的防曬霜。（一些抗結核藥片可能會使您的皮膚對陽光更加敏感）。

副作用

- 您可能會注意到尿液、汗水、淚液會變成紅色或橘色。這是無害的副作用。（軟式隱形眼鏡可能會變色）。

- 抗結核藥物會降低口服避孕藥和其他避孕方法的效用。這意味著您還需要使用可靠的屏障避孕法，例如保險套。請諮詢您的醫師或藥師，以了解其他避孕方法。
- 服用抗結核藥物期間，醫師可能需要調整其他藥物的劑量。（例如華法林、抗驚厥藥、類固醇、美沙酮等，醫師會根據需要進行調整。）

如果您服用抗結核藥物後出現不適，請不要停止服用或漏服。請聯絡您的醫生或結核病專科護理師尋求協助。

如果您有以下任何副作用，請立即聯絡結核病專科護理師或您的醫師尋求建議：

- 嘔吐
- 發燒
- 視覺障礙
- 持續性皮炎或搔癢
- 手指或腳趾刺痛

不要過早停止服用藥物

即使你感覺好轉，也不要急於停止服藥。

如果過早停止用藥，細菌會繼續生長，變得**更難**治療。

由於細菌可能對抗生素治療產生了**抗藥性**，您可能需要服用更多藥片並**延長**療程。

這意味著抗生素已無法殺死你體內的細菌。

你還可能面臨將**結核桿菌傳染**給你的**家人**、朋友或其他與你接觸的人的**風險**。

使用的結核病藥物：

有時，一片藥片會同時含有2-3種抗生素。

Voractiv 沃拉克蒂克		
Rifater 里法特		
Rifinah 里菲那		
Ethambutol 乙胺丁醇		

結核病藥物也可依下列方式服用：

Rifampicin 利福平		
Isoniazid 異煙肼		
Pyrazinamide 吡嗪醯胺		
Pyridoxine 吡哆醇 (vitamin B6) (維生素B6)		

記住：

- 結核病可以透過正確的治療治愈
- 您必須每天依照醫囑服用抗生素片。
- 除非醫生或護士告知，否則請勿停止服用抗生素片。
- 盡量按時參加所有門診預約