


Hindi



गर्भपात की पुष्टि के बाद



हमें खेद है कि आपको इस कठिन और दर्दनाक अनुभव का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई अपनी गर्भावस्था के नुकसान पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करता है। आप अपनी भावनाओं पर आश्चर्यचकित हो सकती हैं और आपको शोक मनाने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। कुछ महिलाएं दुखी, निराश, दोषी, क्रोधित या अलग-थलग महसूस करती हैं। अन्य लोग अपने नुकसान से अपेक्षा से अधिक तेजी से उबर जाते हैं। महसूस करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है।

इस पत्रक का उद्देश्य आपको आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ जानकारी देना है। यह उन दवाओं के बारे में बताएगा जो कर्मचारी आपको देंगे और जब आप कुछ दिनों के बाद अस्पताल वापस आएंगे तो प्रक्रिया क्या हो सकती है।

यदि आप सोचने के लिए समय निकालें और अपने साथी या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो सहायता प्रदान कर सकता है तो यह मददगार हो सकता है। आपको प्राप्त सारी जानकारी लेने में कठिनाई हो सकती है। यदि आपको आवश्यकता हो, तो उन डॉक्टरों और दाइयों से दोबारा बात करें जो आपकी देखभाल कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि अपना निर्णय लेते समय आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया आश्वस्त रहें कि आपके पास वह निर्णय लेने के लिए समय होगा जो आपके लिए सही लगेगा।

अब क्या होता है?

यदि आप 12 सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती हैं तो आपके बच्चे के जन्म के लिए प्रसव प्रेरित करना आवश्यक है। वर्तमान में हम जिस उपचार की अनुशंसा करते हैं उसमें मिफेप्रिस्टोन नामक दवा का उपयोग शामिल है। एक दाई आपको एक गोली के रूप में मिफेप्रिस्टोन देगी जिसे आप अस्पताल में भर्ती होने से लगभग 36 से 48 घंटे पहले निगल लेंगे। मिफेप्रिस्टोन गर्भावस्था के हार्मोनों में से एक के प्रभाव को अवरुद्ध करके काम करता है; यह आपके गर्भाशय को उपचार के अगले चरण के लिए तैयार करता है। आप किसी भी दर्द को कम करने के लिए पेरामिटामोल या को-कोडामोल ले सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन या इबुप्रोफेन न लें क्योंकि ये उपचार में बाधा डालते हैं। यदि आप पहले से ही दवा ले रहे हैं, तो कृपया उपचार से पहले दाई या डॉक्टर को बताएं। यदि दर्द गंभीर है, तो कृपया लेबर वार्ड से संपर्क करने में संकोच न करें।

- प्रिंसेस रॉयल मेटरनिटी (PRM) पर ☎ 0141 201 3302
- क्वीन एलिज़ाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (QEUH) पर ☎ 0141 201 2292

- रॉयल एलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल (RAH) पर ☎ 0141 314 6743
- इनवरक्लाइड रॉयल हॉस्पिटल (IRH) पर ☎ 01475 504 619
- वेल ऑफ लेवन (VOL) पर ☎ 01389 828 599

आप मिफेप्रिस्टोन लेने और अस्पताल जाने के बीच के 2 दिन ऐसे तरीके से बिता सकते हैं जो आपके लिए सही लगे, चाहे वह घर पर हो या काम पर। इस अवस्था में गर्भपात होने की बहुत कम संभावना होती है लेकिन यह असामान्य है। यदि इस दौरान आपको योनि से रक्तस्राव होता है तो आपको संक्रमण के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए टैम्पोन के बजाय सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए।

यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं या मिफेप्रिस्टोन लेते समय बीमारी-रोधी गोली चाहते हैं, तो कृपया अपनी दार्ढ़ से पूछें। यदि आप टैबलेट लेने के 2 घंटे के भीतर बीमार हो जाते हैं तो कृपया अस्पताल से संपर्क करें क्योंकि आपको दूसरी टैबलेट के लिए वापस लौटना पड़ सकता है। यदि आप भोजन या तरल पदार्थ रखने में असमर्थ हैं तो कृपया प्रसव वार्ड (पिछले पृष्ठ पर दिए गए नंबर) से संपर्क करें।

हालाँकि, अधिकांश महिलाओं को मिफेप्रिस्टोन से दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये सभी दवाओं के साथ हो सकता है। ये व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं लेकिन इनमें शामिल हो सकते हैं:

- योनि से रक्तस्राव
- ऐंठन या मासिक धर्म जैसा दर्द
- मतली (बीमार महसूस करना) और उल्टी
- सिर दर्द
- त्वचा पर चकत्ते

डॉक्टर सभी संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे और यदि आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो हम आपसे एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने या उपचार के लिए सहमत होने के लिए मौखिक सहमति देने के लिए कह सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप समझते हैं कि इसमें क्या शामिल है।



जब मैं घर जाता हूँ तो क्या होता है?

यह असंभव है, लेकिन संभव है, कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए वापस आने से पहले आपको कुछ जकड़न या प्रसव पीड़ा हो सकती है। अगर आपको किसी बात की चिंता है या अगर आपके पास यदि आपको किसी प्रकार का दर्द या रक्तस्राव हो, तो लेबर वार्ड को फोन करने में संकोच न करें (नंबर पिछले पृष्ठ पर दिए गए हैं)। 24 घंटे ड्यूटी पर दाइयाँ और डॉक्टर मौजूद हैं जो आपको सलाह दे सकेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम आपको योजना से पहले ही अस्पताल में भर्ती करा देंगे।

आगे क्या होता है?

अस्पताल में आपके प्रवेश की सुबह हम आपसे 9.30 बजे प्रसव वार्ड में आने के लिए कहेंगे। एक दाई आपको भर्ती करेगी, पिछले 2 दिनों में हुए किसी भी रक्तस्राव या दर्द के बारे में पूछेगी और आपके किसी भी प्रश्न और चिंता को सुनेगी। यदि आपके पास कोई अन्य लक्षण हैं तो कृपया दाई को इसका उल्लेख करें। दाई खून लेगी और आपकी बांह या हाथ में ड्रिप लगाएगी। वे गर्भाशय की गर्दन के बगल में आपकी योनि में मिसोप्रोस्टोल नामक दवा वाली छोटी गोलियां डालने के लिए योनि परीक्षण करने की आपकी अनुमति मांगेंगे। इससे गर्भाशय की गर्दन को नरम करने में मदद मिलेगी और इससे आपका गर्भाशय सिकुड़ना शुरू हो सकता है। यदि आपके बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो 3 घंटे के बाद हम आपको योनि के माध्यम से या आपकी जीभ के नीचे आगे की गोलियाँ देंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो हम आपको डिलीवरी तक हर 3 घंटे में और गोलियाँ देंगे, 24 घंटे में अधिकतम 5 खुराक तक। आपके उपचार के दौरान, यह संभावना है कि आपको गर्भावस्था के आसपास का पानी रिसता हुआ महसूस होगा। आपकी योनि से कुछ समय के लिए तरल पदार्थ का रिसाव हो सकता है।

किसी स्तर पर आपको नियमित संकुचन का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाओं को प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत दर्दनाक लगता है और कुछ को कम। आपकी दाई आपके लिए उपलब्ध दर्द निवारण के प्रकारों पर आपसे चर्चा करेगी और आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इससे आपको व्यक्तिगत रूप से मदद मिलेगी। दुर्भाग्यवश यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस प्रक्रिया का यह हिस्सा कितनी देर तक चलेगा। कुछ महिलाएँ कुछ ही घंटों में प्रसव कर देती हैं, जबकि अन्य को इससे कहीं अधिक समय लग सकता है।

इन परिस्थितियों में मिफेप्रिस्टोन लेने से प्रसव पीड़ा प्रेरित करने की प्रक्रिया छोटी हो सकती है।

एक बार जब आप बच्चे को जन्म दे देंगी, तो आपकी गर्भावस्था की अवधि के आधार पर, हम आपको रक्तस्राव को धीमा करने और प्लेसेंटा (जन्म के बाद) को बाहर आने में मदद करने के लिए एक इंजेक्शन की पेशकश करेंगे। कभी-कभी पूरा प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है, और यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर आपसे प्लेसेंटा निकालने के सर्वोत्तम तरीके पर चर्चा करेंगे। आपको एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है जिसमें सुलाया जाना (सामान्य संवेदनाहारी) और डॉक्टर द्वारा थिएटर में नाल को निकालना शामिल है। इस प्रक्रिया में प्रक्रिया के बाद के दिनों में संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा होने की थोड़ी संभावना होती है। यदि आपको इस सर्जिकल प्रक्रिया की आवश्यकता है तो आपका डॉक्टर आपके साथ इस बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेगा और हम आपसे सर्जिकल प्रक्रिया के लिए एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे।

संभवतः सबसे अच्छा होगा कि आप अस्पताल में एक रात ठहरने की अपेक्षा रखें और अपने साथ कुछ नाइटक्लोथ्स, धोने का सामान, आरामदायक कपड़े और शुरुआती चरणों के लिए शायद कुछ पढ़ने की सामग्री लेकर आएँ। कृपया कोई भी दवाइयाँ भी लाएँ जो आप लेते हैं या जिसकी आपको आवश्यकता हो। यदि आप यही चाहते हैं तो आपके साथी या आपकी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति का आपके साथ रहने के लिए स्वागत है।

अपने बच्चे को देखना और उसके साथ समय बिताना

जब आपका बच्चा पैदा होता है तो यह पूरी तरह से आपकी पसंद है कि आप अपने बच्चे को देखना चाहेंगी या गोद में लेना चाहेंगी। हम आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे और किसी भी विकल्प में आपका समर्थन करेंगे। कई माता-पिता ने पाया है कि अपने बच्चे को देखने या गोद में लेने से वे उनके प्रति अधिक वास्तविक हो गए हैं और इससे उन्हें अपने नुकसान से उबरने में मदद मिली है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का रंग गर्भावस्था के बाद पैदा हुए बच्चे की तुलना में अधिक गहरा हो सकता है।

आपकी देखभाल के लिए जिम्मेदार दाई आपसे जन्म के बाद आपकी देखभाल के बारे में बात करेगी। आप उन तरीकों पर चर्चा करना चाह सकते हैं जिनसे आप अपने बच्चे को याद रख सकते हैं। हर कोई अलग-अलग भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव करता है और आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही लगे।

आप महसूस कर सकते हैं कि आप चाहेंगे:

- अपने बच्चे को देखें या पकड़ें
- अपने बच्चे को घर ले जाएँ
- अस्पताल के पादरी के साथ नामकरण समारोह या आशीर्वाद लें
- अपने बच्चे की तस्वीरें रखें
- एक मेमोरी बॉक्स रखें
- स्मृति चिन्ह के रूप में पैरों के निशान और हाथ के निशान रखें
- वार्ड द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र हो
- अपने बच्चे का नाम स्मरण पुस्तक में जोड़ें

यदि आप अनिश्चित हैं तो हम तस्वीरें, हाथ के निशान और पैरों के निशान ले सकते हैं और उन्हें आपके नोट्स के साथ संग्रहीत कर सकते हैं ताकि यदि आप बाद में निर्णय लें कि आप उन्हें लेना चाहते हैं तो वे उपलब्ध हों।

कई माता-पिता अपने बच्चे का लिंग जानना चाहते हैं। 22 सप्ताह से पहले इसे सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में यह संभव हो सकता है, जब किसी भी आनुवंशिक जाँच के परिणाम या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए।

मेरे बच्चे और प्लेसेंटा को क्या होता है?

आपके बच्चे को जन्म देने के बाद दाईं उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करेगी। हम आपके बच्चे का पोस्टमार्टम परीक्षण करवाने की पेशकश करेंगे। इससे हमें ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपकी गर्भपात के संभावित कारणों को समझने में मदद करेगी और यह भी पता चल सकता है कि भविष्य में यह फिर से होने की संभावना कितनी है। हालाँकि, कभी-कभी इसका कारण पता नहीं चल पाता है। जब आप अस्पताल में होंगे तो एक डॉक्टर आपसे इस पर चर्चा करेगा और बताएगा कि पोस्टमार्टम में क्या शामिल होता है। . पोस्टमार्टम करवाने का निर्णय आपका है। आपकी सहमति के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम यथाशीघ्र होता है, हालांकि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। यह क्वीन एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी अस्पताल में होता है। क्वीन एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के एक कर्मचारी आपके अंतिम संस्कार एजेंट से संपर्क करेंगे, यदि आपके पास कोई हो, जब पोस्टमार्टम पूरी हो जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि पोस्टमार्टम के परिणाम कुछ सप्ताह बाद ही उपलब्ध होंगे। जब हमें परिणाम मिल जाएंगे, तब आपका संपर्क व्यक्ति आपसे परिणामों पर चर्चा करने के लिए संपर्क करेगा।

आप हिस्टोलॉजी परीक्षण पर विचार करना चाह सकते हैं, यह वह जगह है जहां हम माइक्रोस्कोप के तहत आपके प्लेसेंटा के छोटे हिस्सों की जांच करते हैं। यह हमें आपके नुकसान के संभावित कारण और यदि यह प्लेसेंटा से संबंधित है तो इसके दोबारा होने की संभावना के बारे में कुछ सीमित जानकारी दे सकता है। हम आनुवंशिकी परीक्षण भी प्रदान करते हैं जिसमें नाल से छोटे नमूने लेना शामिल है।

अत्यंत संकटपूर्ण समय में अपने बच्चे के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना भारी पड़ सकता है। सभी विकल्पों पर विचार करना और उन विकल्पों को चुनने में समय लेना महत्वपूर्ण है जो आपके और आपके बच्चे के लिए सही हैं। कृपया अपनी दाई के साथ किसी विशिष्ट व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या धार्मिक आवश्यकताओं पर चर्चा करें।

आप चाहें तो अपने स्वयं के अंतिम संस्कार एजेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, जो आपके बच्चे के लिए निजी दाह संस्कार या अंतिम संस्कार का प्रबंध करेगा। (कृपया ध्यान दें कि निजी अंतिम संस्कार पर खर्च हो सकता है।). आपके द्वारा चुने गए अंतिम संस्कार निदेशक आपको श्मशान की तारीख, समय और स्थान प्रदान करेंगे।

यदि आपके बच्चे का जन्म 24 सप्ताह से पहले हुआ है तो आप चाह सकते हैं कि अस्पताल आपके बच्चे के दाह संस्कार की व्यवस्था करे।

अधिक जानकारी 'गर्भपात, मृत जन्म या नवजात मृत्यु के बाद दफनाने और दाह संस्कार के लिए विकल्प और विकल्प' पत्रक में उपलब्ध है, जो आपकी दाई आपको जन्म के बाद प्रदान करेगी।

आप कितने समय तक अस्पताल में रहेंगे यह आपकी पसंद है। कुछ महिलाएं जितनी जल्दी हो सके घर जाना पसंद करती हैं, अन्य कुछ देर रुकना और आराम करना पसंद करती हैं। अस्पतालों में उन परिवारों के लिए समर्पित कमरे हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है; यह आपको अपने परिवार या दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देता है जो आपका समर्थन करने और आपके और आपके बच्चे के साथ यादें बनाने में सक्षम होंगे।

जब मैं घर जाता हूँ तो क्या होता है?

जब आप घर जाने के लिए तैयार होंगे तो दाई आपसे चर्चा करेगी कि क्या आप चाहेंगे कि सामुदायिक दाई आपसे मिलने आए।

हम आपके सलाहकार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करेंगे। यह बैठक आमतौर पर प्रसव के लगभग 12 सप्ताह बाद होती है, लेकिन आपकी विशिष्ट परिस्थितियों या अनुरोधित जांच के प्रकार के आधार पर बाद में भी हो सकती है। यदि आपको 16 सप्ताह के बाद भी अपनी बैठक की तारीख नहीं मिली है तो कृपया अपने सलाहकार सचिव से संपर्क करें जो पता लगाएगा कि आपको नियुक्ति क्यों नहीं मिली है।

अपने सलाहकार के साथ बैठक में, वे किसी भी भविष्य की गर्भधारण से पहले पूर्व-गर्भधारण देखभाल और आपकी देखभाल के लिए एक प्रबंधन योजना पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप दोबारा गर्भधारण करती हैं, तो आप प्रारंभिक गर्भावस्था इकाई से संपर्क कर सकती हैं:

- प्रिसेस रॉयल मेटर्निटी (PRM) पर ☎ 0141 211 5317
- क्वीन एलिज़ाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (QEUH) पर ☎ 0141 201 2331
- रॉयल एलेक्ज़ैंड्रा हॉस्पिटल (RAH) पर ☎ 0141 314 6953
- इनवरक्लाइड रॉयल हॉस्पिटल (IRH) पर ☎ 01475 504 619
- वेल ऑफ लेवन (VOL) पर ☎ 01389 817 232

फ़िट नोट

यदि आपके नियोक्ता को इसकी आवश्यकता है तो आप अपने नुकसान के बाद काम से छुट्टी के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र की व्यवस्था करने के लिए अपने जीपी से संपर्क कर सकते हैं। आपको जन्म के बाद अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई पर चर्चा करने के लिए अपने जीपी के साथ 6 सप्ताह की प्रसवोत्तर जांच की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

लेबर वार्ड के लिए संपर्क विवरण

प्रिंसेस रॉयल मेटरनिटी (PRM) पर ☎ 0141 201 3302

क्वीन एलिज़ाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (QEUH)

पर ☎ 0141 201 2292

रॉयल एलेक्ज़ैंड्रा हॉस्पिटल (RAH) पर ☎ 0141 314 6743

इनवरक्लाइड रॉयल हॉस्पिटल (IRH) पर ☎ 01475 504 619

वेल ऑफ लेवन (VOL) पर ☎ 01389 828 599

डिस्चार्ज होम

घर से छुट्टी मिलने के बाद यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण या चिंता है तो कृपया अपने जीपी, एनएचएस 24 से 111 या लेबर वार्ड से संपर्क करने में संकोच न करें।

- आपको गंभीर दर्द है जो साधारण दर्द निवारक गोलीयों से दूर नहीं होता है।
- आपको बुखार महसूस होता है, ठंड लगती है या कंपकंपी महसूस होती है
- आपको भारी रक्तस्राव हो रहा है
- आपको योनि स्राव हो रहा है जिसमें से दुर्गंध आ रही है

प्रसवकालीन मृत्यु दर समीक्षा प्रक्रिया

हम आपको आश्चस्त करना चाहते हैं कि हम एनएचएस ग्रेटर ग्लासगो और क्लाइड के भीतर किसी भी मौत को बहुत गंभीरता से लेते हैं और जब किसी बच्चे की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है तो हम अपनी देखभाल की विस्तार से समीक्षा करते हैं। यदि आपके बच्चे की 22 सप्ताह के गर्भ के बाद मृत्यु हो जाती है, तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान और आपके बच्चे के जन्म के बाद आपको जो देखभाल मिली, उस पर आने वाले हफ्तों में एक टीम बैठक में चर्चा की जाएगी जिसमें प्रसूति विशेषज्ञ (गर्भावस्था में महिलाओं की देखभाल करने वाले डॉक्टर) शामिल होंगे। दाइयां और एक नियोनेटोलॉजिस्ट (एक डॉक्टर जो नवजात शिशुओं की देखभाल करता है)। यदि आवश्यक हो, तो एक बालरोग विशेषज्ञ (एक डॉक्टर जो बच्चों की देखभाल करते हैं) और एक पैथोलॉजिस्ट (एक डॉक्टर जो किसी के मरने के बाद जाँच करता है) भी चर्चाओं का हिस्सा होंगे।

हमारे लिए आपकी देखभाल की विस्तार से जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि हम आपको आपके बच्चे की मृत्यु के कारण के बारे में यथासंभव अधिक जानकारी दे सकें। जो कुछ हुआ उसे समझने से हमें भविष्य में माता-पिता और परिवारों की देखभाल में सुधार करने में भी मदद मिलती है, जहाँ हम कर सकते हैं।

हम अपनी अस्पताल टीम की बैठक और आपके बच्चे की मृत्यु की समीक्षा के हिस्से के रूप में आपकी देखभाल के बारे में आपके विचार शामिल करना चाहेंगे। इसलिए हम आपको उन मुद्दों को उठाने का अवसर देना चाहेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है; यह पूरी तरह से आपका निर्णय है।

यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो कृपया ईमेल करें:

✉ QEUHperinatal@ggc.scot.nhs.uk

✉ PRMPerinatal@ggc.scot.nhs.uk

✉ ggc.clydeperinatal@ggc.scot.nhs.uk

इस पत्रक को पढ़ने के बाद भी आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं

आप इस स्थान का उपयोग वह सब कुछ लिखने के लिए कर सकते हैं जिस पर आप किसी दाई या डॉक्टर से चर्चा करना चाहते हैं।

सहायता सेवाएँ आपके लिए उपलब्ध हैं

आध्यात्मिक देखभाल और कल्याण टीम 24 घंटे ऑन कॉल सेवा है और आप उनसे यहां संपर्क कर सकते हैं:

प्रिंसेस रॉयल मेटरनिटी पर ☎ 0141 211 4661

क्वीन एलिज़ाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पर ☎ 0141 452 3221

इनवरक्लाइड रॉयल हॉस्पिटल पर ☎ 01475 504 759

रॉयल एलेक्ज़ैंड्रा हॉस्पिटल और वेल ऑफ लेवन ☎ 0141 314 9561

या ईमेल करे ✉ chaplains@ggc.scot.nhs.uk

आगे की सलाह और सहायता यहां उपलब्ध है:

मिसकैरेज एसोसिएशन –

🌐 www.miscarriageassociation.org.uk ☎ 0141 552 5070

SANDS: 🌐 www.sands.org.uk ☎ 0808 164 3332

चाइल्ड बरीवमेंट यूके:

🌐 www.childbereavementuk.org ☎ 0800 02 888 40

Simba: 🌐 www.simbacharity.org.uk/support/

✉ glasgowsimbacharity@gmail.com

एंटेनटल रिज़ल्ट्स एंड चॉइसेस:

🌐 www.arc-uk.org ☎ 020 7713 7486

बेबी लॉस रिट्रीट:

🌐 www.babylossretreat.org.uk ☎ 07555 467 805

मुस्लिम बरीवमेंट सपोर्ट सर्विस:

🌐 www.mbss.org.uk ☎ 07519 820 789

गोपनीयता और रोगी जानकारी का उपयोग

NHS ग्रेटर ग्लासगो एंड क्लाइड यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी केवल अधिकृत लोगों के लिए ही उपलब्ध हो। हमारे कर्मचारियों पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखने का कानूनी और संविदात्मक दायित्व है। वर्तमान डेटा सुरक्षा कानून और हम आपकी जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर डेटा प्रोटेक्शन नोटिस देखें: www.nhsggc.scot या हमारी डेटा प्रोटेक्शन नोटिस की प्रति के लिए किसी कर्मचारी से पूछें।

प्रतिक्रिया

आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो कृपया Care Opinion पर जाएँ:

www.careopinion.org.uk