


ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ (CVS)



ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਸੈਪਲਿੰਗ (CVS) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ CVS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬੇੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਆਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ CVS 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਨਿਊਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਸੀ)।
- ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਐਡਵਰਡਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਪਟੋ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਲਈ 'ਹਾਈ ਚਾਂਸ' ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ-ਇਨਵੇਸਿਵ ਪ੍ਰੈਨੇਟਲ ਟੈਸਟਿੰਗ (NIPT) ਨਾਮਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ CVS ਤੇ ਜਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੇਸਿਸ ਨਾਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ CVS ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- ਸੀਵੀਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਜੋਖਮ
- ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ
- ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
- ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
- ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
- ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HIV ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ CVS ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।


CVS ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪਲੈਸੈਂਟਾ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

CVS ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ (ਪੇਟ) ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। CVS ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਐਬਡੋਮਿਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ)।

ਟ੍ਰਾਂਸਐਬਡੋਮਿਨਲ ਸੀਵੀਐਸ



ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਈ ਪੇਟ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤੂੜੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

CVS ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

- ਹਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਤਰਾ 0.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਰ 200 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1)।
- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ (CVS ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 1000 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ) ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਲੇਸੈਟਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਨਾਮਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1% (100 ਵਿੱਚੋਂ 1) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੀਸਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਰੀਸਸ (Rh) ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ-ਡੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

CVS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ), ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਸੁੰਗੜਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਡੋਅਕੋਅਰ - ਪ੍ਰਿੰਸੇਸ ਰਾਇਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

☎ 0141 201 3456 ਅਤੇ ☎ 0141 201 3457

ਜਣੇਪਾ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਣੇਪਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ

☎ 0141 201 3453

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਐਡਵਰਡਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਪਟੋ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ/ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਕ-ਅੱਪ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੁਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ CVS ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਮੋਜ਼ੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ), ਜੈਨੇਟਿਕਸਿਸਟ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੇਕੋਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 **0141 201 3456.**

CVS ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਲੈਣਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਵਿੱਚੋਂ 2 (2%) ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਏਆਰਸੀ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ)

12-15 ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਮਿਊਜ਼

ਲੰਡਨ W1H 1LX

☎ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0207 713 7486 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ)

✉ info@arc-uk.org

🌐 www.arc-uk.org

ਡਾਊਨਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਲੈਂਗਡਨ ਡਾਊਨ ਸੈਂਟਰ

2a ਲੈਂਗਡਨ ਪਾਰਕ

ਟੈਡਿੰਗਟਨ TW11 9PS

☎ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0333 1212 300 (ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ)

✉ info@downs-syndrome.org.uk

🌐 www.downs-syndrome.org.uk

ਸਾਫਟ ਯੂਕੇ (ਪਟਾਊ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਸਿੰਡਰੋਮ)

48 ਫ੍ਰੰਗਗੇਟਸ ਰਾਈਡ

ਵਾਲਮਲੇ

ਸਟਨ ਕੋਲਡਫੀਲਡ B76 2TQ

☎ 0121 351 3122

✉ enquiries@soft.org.uk

🌐 www.soft.org.uk

ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

c/o ਕਲੇਟਨ ਹਸਪਤਾਲ

ਨੌਰਥਗੇਟ

ਵੇਕਫੀਲਡ

ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ WF1 3JS

☎ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 01924 200799 (ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ)

✉ info@miscarriageassociation.org.uk

🌐 www.miscarriageassociation.org.uk

ਹਵਾਲਾ:

ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਅੰਬਸਟੇਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ। ਐਮਨੀਓਸੈਟੇਸਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਸੈਪਲਿੰਗ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੰ. 8. London: RCOG, 2021.