


ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਕਤਿਬਚੇ ਵੱਚਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਲਿਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।



ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ (IOL) ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% (5 ਵਿੱਚੋਂ 1) ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਰਿਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ।

ਇੱਥੇ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ IOL ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਕੀਉ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL:

- ਜਣੇਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਰਮੋਨ ਪੇਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ (40+7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ)।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਇਹ IVF ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਕੋਲੈਸਟੈਸਿਸਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ:

- ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ਿਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹੇਗਾ।
- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ (ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ IOL ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਨ ਐਲਜ਼ਾਬੈਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (QEUB), ਪ੍ਰਸਿਸ ਰਾਇਲ ਮੈਟਰਨਟੀ (PRM) ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹਸਪਤਾਲ (RAH) ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ।

ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਬਾਕਸ A ਵੇਖੋ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਬੈਗ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ।

ਕਦਮ - 1

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਚੈਕਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਿ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਪ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਲਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਿਗਿਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ) ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।


ਕਦਮ - 2

ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਸਰਵਕਿਸ) ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (ਯੋਨੀ ਜਾਂਚ) ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾਬਾਂ ਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ - 3

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਰਿ 'ਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੈਥੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਨੌਕਸ (ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅਰਾਮੀ ਸਰਿਫ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਵਾਂਗੇ (ਬੋੜ੍ਹੇ ਜਹਿ ਨਰਿਜੀਵ ਤਰਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਰ ਕੇ) ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।



ਕਦਮ - 4

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਲਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਗਿਰਾਨੀ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ CTG ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਿਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਚਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਤੁਰ-ਫਰਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ-ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਚਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭ (ਸਰਵਕਿਸ) ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪੱਕਣਾ (ਨਰਮ) ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ (ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਮ ਹਾਰਮੋਨ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਜਾਂ ਝੌਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ - ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇਪੇ ਵੱਚਿ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਨੀ ਵੱਚਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਹਿਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੱਚਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਬਮਿਅਰ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹਿਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਿਾਬ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਡਾੱਗਿ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਡਾੱਗਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਛਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ), ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗ ਵੱਚਿ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਪਿਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

18-24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਕਿਸ 2 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਣੇਪਾ ਵਾਰਡ ਵੱਚਿ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਵੱਚਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਡ੍ਰਾੱਪਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਿਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਕਿਸ 2 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਿੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟਾਨਿ ਪੇਸਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਤਿ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ IOL ਲਈ ਇਨ-ਪੇਸ਼ਟ ਵਾਰਡ ਵੱਚਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।

ਝਲੀਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਫਟਣਾ

ਇਸਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਤੋੜਨਾ' ਵੀ ਕਹਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਕਿਸ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਵੱਚਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝਲੀਆਂ ਵੱਚਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਿਾ ਛੇਕ ਕਰੇਗੀ। ਝਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤਿ (ਸ਼ੁਰੂ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਡੀ ਵੈਚਿ ਆਕਸੀਟੇਸ਼ਨ

ਆਕਸੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾਡੀ ਵੈਚਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਇਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਵੈਚਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁੰਗੜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਨਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਦੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਲਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਰਿੰਤਰ ਨਗਿਰਾਨੀ CTG (ਕਾਰਡੀਓਟੇਕੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਾਅ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਣੇਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੈਚਿ ਕਨਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਟ IOL ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੈਚਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੇਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਤ ਪ੍ਰਸਵ ਉਸ ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਦ ਨਵਿਾਰਕ (ਐਂਡੋਰਫਿਨ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇਪੇ ਵੈਚਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਜਵਿ-ਜਵਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਟੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾਂ ਕੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਿਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਗਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਡ੍ਰਾੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪੀਡੀਊਰਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣੇਪੇ ਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਪੀਡੀਊਰਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

- ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਬਰਥ ਟਰਸਟ National Childbirth Trust (NCT)
🌐 www.nct.org.uk
- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਇਨ ਮੈਟਰਨਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (AIMS)
🌐 www.aims.org.uk
- ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ
🌐 www.birthrights.org.uk
- ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
🌐 www.labourpains.com

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ **COVID-19** ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਣੇਪਾ ਯੂਨਿਟ

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

- ਕਵੀਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਟਰਨਟੀ

☎ 0141 232 4363 ਜਾਂ 4377

- ਪ੍ਰਸਿਸ ਰਾਇਲ ਮੈਟਰਨਟੀ

☎ 0141 211 3452 ਜਾਂ 3454

- ਰਾਇਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਟਰਨਟੀ

☎ 0141 314 6067

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ - ਮੈਟਰਨਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ:

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇਪੇ ਵੱਧੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਨੀ ਵੱਧੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਹਿਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਬਮਿਅਰ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹਿਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਿਬ ਕਰਨ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਡਾਗਿ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਾਕਸ ਏ		
ਤਾਰੀਖ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ	ਸਮਾਂ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ	ਜਗ੍ਹਾ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ
ਤਾਰੀਖ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ	ਸਮਾਂ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ	ਜਗ੍ਹਾ: ਬੈਲੂਨ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਉਣਾ